

Состав

действующее вещество: йод;

100 г препарата содержит йода 1 г

вспомогательные вещества: калия йодид, глицерин, эвкалипта настойка (содержит этанол), вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения.

Основные физико-химические свойства: жидкость красно-бурого цвета с запахом йода и эвкалипта.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики.

Код АТХ R02A A20.

Фармакодинамика

Препарат содержит йод, который оказывает антимикробное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в т.ч. стрептококки, стафилококки, кишечную палочку. Механизм противомикробного действия проявляется в денатурации белка в результате взаимодействия с N-группами белковых молекул.

Фармакокинетика

Выделяется йод из организма главным образом почками, частично - желудочно-кишечным трактом, потовыми железами и проникает в грудное молоко.

Показания

Воспалительные заболевания горла и глотки (тонзиллит, фарингит, ангины, глоссит, стоматит) - в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к йоду и другим компонентам препарата.
Гиперфункция щитовидной железы, декомпенсированная сердечная, почечная, печеночная недостаточность, исследования или терапия радиоактивным йодом (за 2 недели до и после исследования или терапии).

Особые меры безопасности

Препарат предназначен для приема внутрь. Не следует вдыхать и / или проглатывать препарат. С осторожностью применять при ларингите из-за возможности ларингоспазма, при туберкулезе, геморрагических диатезах. Не допускать попадания в глаза.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не применять одновременно с раствором перекиси водорода и другими дезинфицирующими средствами.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Неизвестна.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не применять в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Вернуть распылитель положением вверх, нажать на колпачок 1-2 раза, чтобы раствор поступил к распылителю и после нажатия разбрызгивался. После этого ввести распылитель на 2-3 см в полость рта, закрыть рот, задержать дыхание и нажать 2 раза на колпачок так, чтобы одно орошение было осуществлено справа, второе - слева. После использования часть распылителя, которая снимается, промыть теплой водой. Применять препарат 1-2 раза в сутки (с перерывом не менее 6 часов) после приема пищи. Курс лечения зависит от тяжести течения заболевания, а также от характера сопутствующей терапии.

Дети

Не назначать детям до 8 лет.

Передозировка

Возможно появление йодизма (насморк, крапивница, отек Квинке, слезотечение, слюноотечение, сыпь на коже, мышечная слабость, заторможенность).

Лечение. Немедленное прекращение применения препарата и симптоматическая терапия.

Побочные реакции

При длительном применении могут появиться явления йодизма (насморк, крапивница, отек Квинке, слезотечение, слюноотечение, сыпь на коже, мышечная слабость, заторможенность), крапивница.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 мл во флаконе с механическим распылителем в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ГКП» Фармацевтическая фабрика ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).