

## **Состав**

*действующее вещество:* йод;

100 г препарата содержит йода 1 г

*вспомогательные вещества:* калия йодид, глицерин, эвкалипта настойка (содержит этанол), вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Раствор для наружного применения.

*Основные физико-химические свойства:* жидкость красно-бурого цвета с запахом йода и эвкалипта.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики.

Код АТХ R02A A20.

## **Фармакодинамика**

Препарат содержит йод, который оказывает антимикробное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в т.ч. стрептококки, стафилококки, кишечную палочку. Механизм противомикробного действия проявляется в денатурации белка в результате взаимодействия с N-группами белковых молекул.

## **Фармакокинетика**

Выделяется йод из организма главным образом почками, частично - желудочно-кишечным трактом, потовыми железами и проникает в грудное молоко.

## **Показания**

Воспалительные заболевания горла и глотки (тонзиллит, фарингит, ангины, глоссит, стоматит) - в составе комплексной терапии.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к йоду и другим компонентам препарата.  
Гиперфункция щитовидной железы, декомпенсированная сердечная, почечная, печеночная недостаточность, исследования или терапия радиоактивным йодом (за 2 недели до и после исследования или терапии).

### *Особые меры безопасности*

Препарат предназначен для приема внутрь. Не следует вдыхать и / или проглатывать препарат. С осторожностью применять при ларингите из-за возможности ларингоспазма, при туберкулезе, геморрагических диатезах. Не допускать попадания в глаза.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не применять одновременно с раствором перекиси водорода и другими дезинфицирующими средствами.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Неизвестна.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Не применять в период беременности и кормления грудью.

### **Способ применения и дозы**

Вернуть распылитель положением вверх, нажать на колпачок 1-2 раза, чтобы раствор поступил к распылителю и после нажатия разбрызгивался. После этого ввести распылитель на 2-3 см в полость рта, закрыть рот, задержать дыхание и нажать 2 раза на колпачок так, чтобы одно орошение было осуществлено справа, второе - слева. После использования часть распылителя, которая снимается, промыть теплой водой. Применять препарат 1-2 раза в сутки (с перерывом не менее 6 часов) после приема пищи. Курс лечения зависит от тяжести течения заболевания, а также от характера сопутствующей терапии.

### **Дети**

Не назначать детям до 8 лет.

### **Передозировка**

Возможно появление йодизма (насморк, крапивница, отек Квинке, слезотечение, слюноотечение, сыпь на коже, мышечная слабость, заторможенность).

*Лечение.* Немедленное прекращение применения препарата и симптоматическая терапия.

### **Побочные реакции**

При длительном применении могут появиться явления йодизма (насморк, крапивница, отек Квинке, слезотечение, слюноотечение, сыпь на коже, мышечная слабость, заторможенность), крапивница.

### **Срок годности**

3 года.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 ° в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 20 мл во флаконе с механическим распылителем в пачке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ООО «ГКП» Фармацевтическая фабрика ».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).