

Состав

действующие вещества: dequalinium chloride, tyrothricin, enoxolone (β-glycyrrhetic acid), hydrocortisone acetate, lidocaine hydrochloride;

1 мл спрея содержит деквалиния хлорида 1 мг, тиротрицина 4 мг, эноксолонa (β-глицирретиновой кислоты) 0,6 мг, гидрокортизона ацетата 0,6 мг, лидокаина гидрохлорида 1 мг;

вспомогательные вещества: пропиленгликоль, масло ананасовое, сахарин натрия, этанол 96% (об / об).

Лекарственная форма

Спрей для полости рта.

Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор от бесцветного до слегка желтоватого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики.
Код АТХ R02A A20.

Фармакодинамика

Ангиноваг сочетает в своем составе вещества противовоспалительного, анальгезирующего, антибактериальной и антисептического действия, оказывающие взаимодополняющий и синергический влияние.

Указанные фармакологические свойства обеспечивают комплексную патогенетическую терапию воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и слизистой оболочки ротовой полости.

Тиротрицин является местным антибиотиком, активным в отношении многих грамположительных бактерий *Bacillus Brevis Dubos*. Он является активным в отношении многих грамположительных бактерий.

Деквалиния хлорид является антисептическим и дезинфицирующим средством. Он продемонстрировал активность против многих бактерий, дрожжей и грибов.

Гидрокортизона ацетат является противовоспалительным средством, специфическим для первичного и повторного воспаления в острой стадии воспалительного процесса.

Эноксолон является мощным ингибитором фермента 11-гидроксистероид дегидрогеназы. Еноксолон продемонстрировал способность усиливать активность кортизола при одновременном применении.

Гидрохлорида лидокаин является местным болеутоляющим средством амидной группы. Он действует путем ингибирования ионных рефлексов, необходимых для стимуляции и проведения нервных импульсов.

Фармакокинетика

Никакой системной абсорбции любого из активных ингредиентов не выявлено.

Показания

Местное лечение при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и верхних дыхательных путей: тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный и язвенный стоматит, глоссит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность (аллергия) к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат содержит этанол, это может изменить или усилить эффект других лекарственных средств.

Антибактериальная активность деквалиния снижается при одновременном применении с анионными тензидами, например, при пользовании зубной пастой.

Особенности применения

Препарат содержит этанол. Каждое приложение включает примерно 0,075 г этанола, который может быть вреден для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью, детям и пациентам с заболеваниями печени и больным эпилепсией.

Во время приема препарата Ангиноваг возможен положительный тест на допинг.

Препарат может вызвать раздражение кожи, поскольку он содержит пропиленгликоль.

Следует избегать попадания спрея в глаза.

Нарушения со стороны зрения

При применении системных или местных кортикостероидов возможны расстройства зрения. Если у пациента наблюдаются такие симптомы, как помутнение зрения или другие расстройства зрения, ему нужно обратиться к врачу-офтальмологу для установления возможных причин, среди которых могут быть катаракта, глаукома или редкие заболевания, такие как центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХ), случаи которой регистрировались после применения системных или местных кортикостероидов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Отсутствуют данные о вредном влиянии на способность управлять автомобилем и работать с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Клинические данные о применении препарата Ангиноваг в период беременности или кормления грудью отсутствуют.

Способ применения и дозы

Применять взрослым и детям старше 13 лет. Перед применением в случае необходимости прополоскать рот и глотку кипяченой теплой водой. С пораженных участков (язвы, эрозии) тампоном удалить некротический налет. Первые двое суток - по 1 - 2 впрыска каждые 2 - 3 часа, далее - по 1 впрыску каждые 6 часов. Курс лечения определяет врач индивидуально, обычно он составляет 5 - 7 суток.

Способ применения.

Для правильного использования рекомендуется держать флакон вертикально; пероральный аппликатор направить в зону поражения, но не полностью вводить в ротовую полость. Нажать на верхнюю часть колпачка сверху вниз.

Флакон снабжен дозирующим клапаном: каждое полное нажатие вызывает регулируемое поступление лекарств.

Дети

В связи с отсутствием клинических данных для этой возрастной группы Ангиноваг не рекомендуется применять детям до 13 лет.

Передозировка

Не описано никаких случаев передозировки.

Побочные реакции

При применении Ангиновага в некоторых случаях в зависимости от наличия повышенной чувствительности пациента к препарату возможно местное раздражение, что, как правило, является временным.

Ниже приведены побочные реакции, которые могут возникать в случае монотерапии одним из действующих веществ препарата Ангиноваг

Деквалиния хлорид

Иногда могут наблюдаться реакции гиперчувствительности после применения препарата, например сыпь, зуд, жжение, раздражение слизистой оболочки ротовой полости и горла. В редких случаях, а именно при злоупотреблении, возможно возникновение язвы и некроза. В случае возникновения каких-либо необычных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно проконсультироваться с врачом относительно дальнейшей терапии.

Тиротрицин

Гиперчувствительность.

Противопоказан для интраназального применения; есть сообщения о том, что такой способ применения может привести к нарушению обоняния.

Гидрокортизона ацетат

Гидрокортизон - стероидный компонент препарата может вызвать местные нежелательные реакции, такие как жжение, зуд, раздражение в месте нанесения препарата, чрезмерное высушивание, атрофические изменения кожи, контактный дерматит, экзема, розацеаподобный дерматит, воспаление кожи вокруг губ, мацерация кожи, угревое высыпание, дермектазии, потница, сыпь, гипертрихоз, депигментация кожи, вторичные кожные инфекции и фолликулит, эффект рикошета, что может привести к стероидной зависимости; пурпура, стрии; замедленное заживление ран. Повышение внутриглазного давления и риск возникновения катаракты (при систематическом попадании препарата на конъюнктиву).

При длительном применении препарата и / или нанесении на обширные участки кожи гидрокортизон может проникать в кровь и вызывать системные нежелательные симптомы, типичные для ГКС, включая угнетение функции

надпочечников.

Со стороны зрения

Частота неизвестна: затуманенное зрение (для детальной информации см. Раздел «Особенности применения.»)

Лидокаина гидрохлорид

Местные эффекты. При применении препарата может возникнуть ощущение жжения, которое после появления анестезирующего эффекта исчезает (в пределах 1 минуты).

В месте нанесения препарата могут наблюдаться транзиторная эритема, отек и снижение чувствительности.

Аллергические реакции, в частности, высыпания на коже, зуд, крапивница, ангионевротический отек, бронхоспазм, в чрезвычайно тяжелых случаях - шок.

В случае появления реакций гиперчувствительности применение препарата следует прекратить.

Системные эффекты. Если препарат применять согласно инструкции, частота развития системных эффектов чрезвычайно низка, поскольку количество активного вещества, которое может достичь кровообращения, очень мала. При применении высоких доз и в случае быстрого всасывания лидокаина или при повышенной чувствительности, идиосинкразии или снижении переносимости могут развиваться такие побочные эффекты:

со стороны центральной нервной системы: возбуждение, депрессия, нервозность, головокружение, сонливость, спазмы, потеря сознания, паралич

органов дыхания;

со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия, инфаркт миокарда, брадикардия.

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30 ° С.

Упаковка

По 10 мл или по 20 мл во флаконе; по 1 флакону вместе с пероральным дозатором в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Феррер Интернасиональ, С.А.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Юридический адрес:

Гран Виа Карлос III, 94, 08028, Барселона, Испания.

Место производства:

с / Хоан Бускайя, 1-9, 08173 Сант Кугат дель Байес (Барселона), Испания.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).