

Состав

действующие вещества: Lactobacillus acidophilus 3×10^6 , Lactobacillus crispatus 5×10^6 , Lactobacillus rhamnosus 5×10^6 , Lactobacillus vaginalis 5×10^6 , молочная кислота 100 мг (мг).

вспомогательные вещества: гидрогенизированные триглицериды, воск пчелиный.

Лекарственная форма

Суппозитории вагинальные.

Фармакологические свойства

Бактерии, входящие в состав средства, представляют собой живые лактобациллы, которые часто встречаются в нормальной микрофлоре и идентичны естественной микробиоте. Лактобациллы выполняют во влагалище защитную функцию за счет создания кислой pH внутренней среды, которая является неблагоприятной для развития и размножения патогенных микроорганизмов, и способны успешно колонизировать урогенитальную зону вытесняя при этом патогенную микрофлору.

Молочная кислота, которая входит в состав средства, расщепляет патологическую биопленку, состоящую из микробных ассоциаций, увеличивает влияние антибактериальных веществ и создает условия для развития нормальной микрофлоры влагалища.

Суппозитории Кольпофлор восстанавливают здоровый вагинальный биоценоз и предотвращают размножение и развитие патогенных микроорганизмов, восстанавливают естественную кислую среду во влагалище (pH 3,8-4,5) и усиливают сопротивление слизистой оболочки против патогенных микробов.

Показания

Суппозитории Кольпофлор рекомендуется применять в качестве поддерживающего средства при состояниях, характеризующихся нарушением микрофлоры влагалища (бактериальный вагиноз, вагинальный дисбиоз, вагинальный кандидоз, гормонозависимый и неспецифический кольпит, специфический и неспецифический вагинит, гонорея, хламидиоз, микоплазмоз,

трихомониаз и т.д.), и как профилактическое средство после гинекологических вмешательств, использования тампонов, местных контрацептивов и при несоблюдении гигиенических норм.

Противопоказания

Повышенная чувствительность (аллергия) к любому компоненту средства.

Применение в период беременности или кормления грудью

Во время беременности и в период лактации использовать после консультации с врачом.

Способ применения и дозы

До и после применения суппозиториев соблюдать правила личной гигиены: вымыть руки. Суппозитории Кольпофлор применять 1-2 раза в сутки (утром и/или вечером перед сном). Суппозиторий освободить от стрипа непосредственно перед применением и ввести глубоко во влагалище в положении лежа на спине, согнув ноги. Суппозиторий не следует резать или ломать на части. Длительность применения составляет 6-12 дней.

Срок годности

3 года от даты производства.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Упаковка

По 6 суппозиториев в блистере, по 2 блистера в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

CYDONIA, Босния и Герцеговина.