

## **Состав**

*действующее вещество:* хлоргексидин;

1 pessaries contains chlorhexidine biglyconate, 20 % solution, which corresponds to chlorhexidine 16 mg;

*вспомогательное вещество:* полиэтиленоксид.

## **Лекарственная форма**

Пессарии.

*Основные физико-химические свойства:* pessaries from white to white with a yellowish tint of color, marbling of the surface is allowed. The presence of a funnel-shaped indentation and an air stержня is allowed.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Противомикробные и антисептические средства, применяемые в гинекологии.  
Код АТХ G01A X.

## **Фармакодинамика**

Хлоргексидина биглюконат оказывает быстрое и выраженное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии, дрожжи и дерматофиты: *Treponema pallidum*, *Chlamidia spp.*, *Ureaplasma spp.*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*. К препарату слабо чувствительны некоторые штаммы *Pseudomonas spp.*, *Proteus spp.* Нечувствительны к препарату кислотостойкие формы бактерий, споры бактерий, грибы, вирусы.

## **Фармакокинетика**

При интравагинальном применении практически не всасывается, системного действия не оказывает.

## **Показания**

- Профилактика венерических заболеваний (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, уреаплазмоз) и инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, перед родами и абортом, до и после установки внутриматочной спирали, до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями).
- Лечение бактериального вагиноза, кольпита, эрозии шейки матки.

### **Противопоказания**

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Хлоргексидина биглюконат нельзя применять вместе с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза), а также с мылом.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Не противопоказано.

### **Способ применения и дозы**

Препарат применять интравагинально. Перед применением пессарий освободить от контурной упаковки.

*Лечение:* применять по 1 пессарию 2 раза в сутки в течение 7-10 дней в зависимости от характера заболевания. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней.

*Профилактика венерических заболеваний:* применять однократно по 1 пессарию не позднее чем через 2 часа после полового акта.

*Беременность.* Учитывая степень выраженности инфекционного процесса, данные бактериологических исследований, наличие угрозы прерывания беременности, хлоргексидина биглюконат применять по 1 пессарию 1 или 2 раза в сутки в качестве монотерапии или в составе комплексной терапии. Длительность применения – от 5 до 10 дней.

При кормлении грудью препарат применять в обычных рекомендованных дозах.

### **Дети**

Опыт применения отсутствует.

### **Передозировка**

Передозировка и токсические эффекты при применении препарата не выявлены.

### **Побочные реакции**

Возможны аллергические реакции, зуд в месте введения суппозитория.

### **Срок годности**

3 года.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 5 пессариев в стрипе, по 2 стрипа в пачке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ООО «ФАРМЕКС ГРУП».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 08301, Киевская обл., г. Борисполь, ул. Шевченка, д. 100.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).