Состав

1 суппозиторий содержит: эпигаллокатехин-3-галлат - 20 мг; гиалуроновая кислота - 10 мг; настойки листьев и цветков чабреца обычного - 20 мг; настойки листьев гамамелиса виргинского - 20 мг; гликолевого экстракта цветков календулы - 20 мг; масляной настойки моркови дикой - 27 мг; бальзама Перу - 10 мг; гексилрезорцин - 2,5 мг; полусинтетические глицериды; тальк; моноэтиловый эфир диэтиленкгликоля; коллоидный диоксид кремния.

Описание

Комбинация гиалуроновой кислоты с другими компонентами, содержащимися в суппозиториях «Гиаваль», способствует процессам восстановления и заживления слизистых оболочек половых органов, повторной эпителизации, восстановлению физиологического уровня pH влагалища, противодействует размножению патогенных микроорганизмов.

Эпигаллокатехин-3-галлат - заживляющее вяжущее средство, которое имеет защитное, противогрибковое, кровоостанавливающее действие, а так же поглощает избыток секреции тканей.

Гамамелис виргинский (настойка) тонизирует сосудистую стенку шейки матки, обладает противовоспалительными свойствами и вяжущим эффект.

Мацера (масляная настойка) моркови дикой способствует восстановлению, увлажнению и улучшению эластичности тканей.

Чабрец обыкновенный обладает антисептическими, дезодорирующими, фунгицидными свойствами (благодаря содержанию эфирного масла чабреца и урсоловой кислоты).

Показания

- При острых и хронических вульвовагинитах, цервицитах, бактериальный вагиноз, неспицифических кольпитах и других воспалительных состояниях влагалища, простых или инфицированных выделениях из влагалища, зуд вульвы;
- при атрофических и дистрофических изменениях слизистых оболочек влагалища и шейки матки, в т.ч. при состояниях, возникших после химиотерапии и действия ионизирующего излучения;
- при цервикальных эрозиях различной этиологии;

- в гинекологической хирургии для восстановления слизистой оболочки, в т.ч. после операций по поводу выпадения стенок влагалища, шейки и тела матки, абортов, после проведения диатермокоагуляции, лазерной терапии и криотерапии шейки матки и влагалища;
- для поддержания нормального состояния слизистой оболочки при сухости влагалища, в т.ч. вызванной дефицитом эстрогенов у женщин в климактерическом периоде;
- для восстановления слизистых оболочек половых органов у женщин после родов.

Противопоказания

Возможна повышенная чувствительность к любому компоненту средства.

Длительное использование или использование во время беременности должно проводиться под наблюдением врача.

Способ применения и дозы

Рекомендуется вводить суппозиторий во влагалище ежедневно вечером в течение 10-15 дней.

Применение рекомендуется начинать после окончания менструации. Курс можно повторить в следующем месяце с целью усиления или сохранения полученного эффекта. После проведения тщательной интимной гигиены возьмите один суппозиторий с блистера, освободите его от пластиковой упаковки и поместите суппозиторий глубоко во влагалище, в положении лежа на спине, слегка согнув ноги.

Условия хранения

Хранить вдали от источников тепла при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке.

Упаковка

По 5 суппозиториев в блистере; по 2 блистера в картонной упаковке.

Производитель

Innate Srl, Италия.