

Состав

действующие вещества: штаммы живых молочнокислых бактерий Lactobacillus gasseri (L. gasseri), Lactobacillus rhamnosus (L. rhamnosus);

1 вагинальная капсула содержит не менее 108 КОЕ L. gasseri и не менее 108 КОЕ L. rhamnosus;

вспомогательные вещества: лактит моногидрат (Е 966), крахмал кукурузный, ксантановая камедь, глюкоза безводная, магния стеарат, титана диоксид (Е 171), желатин.

Лекарственная форма

Капсулы вагинальные.

Основные физико-химические свойства: желатиновые капсулы белого цвета, содержащие белый или почти белый порошок со слабым характеристическим запахом и вкусом.

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробные и антисептические средства, применяемые в гинекологии.

Другие противомикробные и антисептические средства. Lactobacillus fermentum.

Код ATX G01A X14.

Фармакодинамика

Вагинальные капсулы Фемиваг содержат два штамма живых молочнокислых бактерий, обычно доминируют в вагинальной микрофлоре здоровых женщин: L. gasseri и L. rhamnosus.

Хотя способ действия вагинальных молочнокислых бактерий все еще изучается, было показано, что он является многофакторным и связан с действием многих факторов. Вследствие ферментативной выработки молочной кислоты штаммы молочнокислых бактерий, которые доминируют во влагалище здоровых женщин, поддерживают низкие значения pH окружающей среды, подавляющее колонизацию и рост патогенных микроорганизмов. Кроме этого, благодаря своим адгезивным свойствам и способности производить перекись водорода и бактериоцины, молочнокислые бактерии противодействуют инвазии нежелательных микроорганизмов.

Показания

- профилактика и лечение дисбаланса вагинальной бактериальной флоры, симптомами которого являются зуд, сухость, выделение, раздражение, неприятный запах;
- лечения бактериального вагиноза легкой и средней степени тяжести;
- защиту и восстановление природного баланса вагинальной микрофлоры после лечения противомикробными средствами.

Противопоказания

Применение препарата противопоказано в случае гиперчувствительности к действующим веществам или к любым другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Информация о взаимодействий с другими средствами для вагинального введения отсутствует.

Специальных исследований по взаимодействий препарата Фемиваг с другими лекарственными средствами не проводили. Но поскольку молочнокислые бактерии, входящие в состав препарата, чувствительные к действию местных и системных противомикробных средств, проведения подобной комбинированной терапии не рекомендуется.

Особенности применения

В случае ухудшения или отсутствия улучшения симптомов после семидневного курса лечения пациенткам следует обратиться к врачу. В случае развития рецидивов также рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность

Препарат Фемиваг можно применять в период беременности (например для лечения бактериального вагиноза беременных).

Кормление грудью

Препарат Фемиваг можно применять в период кормления грудью.

Способ применения и дозы

Лечение

По 1 вагинальной капсуле вводят глубоко во влагалище каждый вечер перед сном в течение 6-8 дней.

Профилактика

Сразу после завершения менструации: по 1 вагинальной капсуле вводят глубоко во влагалище каждый вечер перед сном в течение 4-6 дней.

После лечения антибиотиками: по 1 вагинальной капсуле вводят глубоко во влагалище каждый вечер перед сном в течение 6-8 дней.

Дети

Препарат не следует применять для лечения детей в возрасте до 12 лет.

Передозировка

Сведения отсутствуют.

Побочные реакции

Существуют отдельные сообщения о развитии аллергических реакций, связанных с применением препарата.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 вагинальных капсул в алюминиевой тубе, закрытой пластиковой крышкой с осушителем.

По 1 тубе в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Бифодан А/С.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Богбиндервей 6, DK-3390 Хундестед, Дания.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).