

## **Состав**

*действующее вещество:* secnidazole;

1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит секнидазола 1,0 г;

*вспомогательные вещества:* крахмал кукурузный, кальция фосфат, целлюлоза микрокристаллическая, натрия крахмала (тип А), повидон (К 30), магния стеарат, тальк

*состав оболочки:* гипромеллоза (Е 15), титана диоксид (Е 171), индиго лак (Е 132), тальк, пропиленгликоль.

## **Лекарственная форма**

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

*Основные физико-химические свойства:* капсулоподобной формы таблетки, покрытые пленочной оболочкой, голубого цвета с тиснением «SECN» с одной стороны и чертой- с другой.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Противопрозоидные средства. Производные нитроимидазола. Код АТХ Р01А В07.

## **Фармакодинамика**

Секнидазол - противопрозоидное средство группы нитроимидазолов с антибактериальным действием. Секнидазол характеризуется бактерицидным (против грамположительных и грамотрицательных анаэробных бактерий) и амебицидным (внутри- и зовнишньокишковим) эффектом. Секнидазол особенно активен в отношении *Trichomonas vaginalis*, *Entamoeba histolytica*, *Giardia lamblia*. Проникая внутрь клетки микроорганизма, секнидазол активируется в результате восстановления 5-нитрогруппы, за счет чего взаимодействует с клеточной ДНК. Происходит нарушение ее спиралевидной структуры и разрушения нитей, ингибирование нуклеотидного синтеза и гибель клетки.

## **Фармакокинетика**

После приема внутрь Секнидокс быстро и полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта. Биодоступность составляет примерно 80%. Секнидазол

проходит через гематоэнцефалический барьер, проникает в грудное молоко. Период полувыведения секнидазола составляет примерно 25 часов, что позволяет упростить схему приема препарата, сделав ее более удобной для пациентов.

## **Показания**

- Трихомонадный уретрит и вагинит (вызванные *Trichomonas vaginalis*);
- бактериальный вагиноз;
- амебиаз кишечника (вызванный *Entamoeba histolytica*);
- амебиаз печени (вызванный *Entamoeba histolytica*);
- лямблиоз (вызванный *Giardia lamblia*).

## **Противопоказания**

- Гиперчувствительность к секнидазолу и другим производным имидазола;
- Органические заболевания центральной нервной системы (ЦНС).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Секнидокс при одновременном применении усиливает действие непрямых антикоагулянтов (производных кумарина и индандиола), повышается риск возникновения кровотечений.

Совместный прием Секнидоксу с дисульфирамом может привести к параноидальные реакции и психозы. Сочетание с алкоголем приводит к симптомам дисульфирамоподобной реакции (спазмы в животе, тошнота, рвота, головная боль, приливы), возможны делириозные нападения и головокружение.

Секнидокс при одновременном применении с препаратами лития повышает его концентрацию в плазме крови.

Препарат не рекомендуется сочетать с недеполяризующими миорелаксантами (векурония бромид).

При сочетании с амоксициллином повышается активность в отношении *Helicobacter pylori* (амоксициллин подавляет развитие резистентности).

## **Особенности применения**

Секнидокс не следует назначать больным с дискразией крови в анамнезе. При лечении препаратом может проявляться обратная нейтропения. Количество

лейкоцитов восстанавливается после прекращения лечения. Во время применения препарата следует избегать употребления алкоголя.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Не применять в период беременности и кормления грудью.

### **Способ применения и дозы**

Секнидокс следует применять внутрь непосредственно перед едой, запивая небольшим количеством воды.

#### Дозы для взрослых

Трихомонадные уретрит и вагинит, бактериальный вагиноз: 2 таблетки однократно.

#### *Амебиаз кишечника:*

*острый амебиаз:* 2 таблетки однократно;

*бессимптомный амебиаз*, включая очаговую и цистного формы: ежедневно по 2 таблетки за 1 прием в течение 3 дней.

*Амебиаз печени:* ежедневно по 1,5 таблетки (1,5 г) в 1 или 2 приема в течение 5 дней.

*Лямблиоз:* 2 таблетки 1 раз в сутки в течение 3 дней.

#### Дозы для детей

#### *Амебиаз кишечника:*

*острый амебиаз:* 30 мг / кг массы тела однократно;

*бессимптомный амебиаз*, включая очаговую и цистного формы: ежедневно по 1 или 2 приема в дозе 30 мг / кг массы тела в течение 3 дней.

*Амебиаз печени:* ежедневно по 1 или 2 приема в дозе 30 мг / кг массы тела в течение 5 дней.

*Лямблиоз:* из расчета 30 мг / кг массы тела (1-1,5 г) однократно.

## **Дети**

Препарат применять детям в возрасте от 12 лет.

## **Передозировка**

*Симптомы:* возможно усиление побочных эффектов.

*Лечение:* специфического антидота не существует. При необходимости проводить симптоматическую терапию.

## **Побочные реакции**

Секнидокс легко переносится, но возможно появление побочных эффектов:

*общие нарушения:* общая слабость;

*со стороны пищеварительного тракта:* нарушение пищеварения, тошнота, боль в области желудка, металлический привкус во рту, глоссит, стоматит.

*Менее распространенные:*

*со стороны системы кроветворения:* умеренная обратимая лейкопения, обратимая нейтропения.

*Аллергические реакции:* реакции гиперчувствительности, включая гиперемию, сыпь, крапивницу.

## **Срок годности**

3 года.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 ° C в сухом и недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 2 таблетки в блистере, по 1 блистеру в картонной коробке.

## **Категория отпуска**

По рецепту.

## **Производитель**

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЙЛИ-креатив - ВЕРНУЙЕ, Франция / LABORATOIRE BAILLY-CREAT - VERNOUILLET, France.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Шмен где Нуизмен, Лью-ди ЛЕ 150 Арпени, ВЕРНУЙЕ, 28500, Франция / Chemin de Nuisement, Lieu-dit les 150 Arpents, VERNOUILLET, 28500, France, France.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).