

## **Состав**

*действующие вещества:* 2,2 мл раствора содержат: Acidum sarcolacticum D4 - 22 мкл, Aesculus hippocastanum D4 - 22 мкл, Arteria suis D10 - 22 мкл, Barium carbonicum D13 - 22 мкл, Cuprum sulfuricum D6 - 22 мкл, Embryo totalis suis D8 - 22 мкл, Funiculus umbilicalis suis D10 - 22 мкл, Hypophysis suis D10 - 22 мкл, Melilotus officinalis D6 - 22 мкл, Natrium pyruvicum D8 - 22 мкл, Nicotiana tabacum D10 - 22 мкл, Placenta totalis suis D6 - 22 мкл, Plumbum jodatum D18 - 22 мкл, Secale cornutum D4 - 22 мкл, Solanum nigrum D6 - 22 мкл, Strophanthus gratus D6 - 22 мкл, Vena suis D8 - 22 мкл, Vipera berus D10 - 22 мкл;

*вспомогательные вещества:* натрия хлорид, вода для инъекций.

## **Лекарственная форма**

Раствор для инъекций.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная бесцветная жидкость без запаха.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Комплексный гомеопатический препарат.

## **Фармакодинамика**

Препарат стимулирует периферическое кровообращение, обладает вентонизирующее, обезболивающее, сосудорасширяющее, антиспастическое действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации его функций.

## **Фармакокинетика**

Для гомеопатических препаратов не определяется.

## **Показания**

Стимуляция периферического кровообращения при атеросклерозе, облитерирующий эндартериит, трофических язв, эндометрите, дисменореи, нейроциркуляторной дистонии, дегенеративных и сосудистых болезнях уха, при гангренозном состоянии ног, вызванном чрезмерным курением и сахарным диабетом; при узловатая эритема, слоновости, пролежнях, остаточных

нарушениях после энцефалита и инсульта, помутнении роговицы.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Возможность применения препарата при заболеваниях щитовидной железы определяет врач.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестно.

## **Особенности применения**

Если симптомы заболевания не исчезают или состояние пациента ухудшается необходимо проконсультироваться с врачом. Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободный от натрия.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Неизвестна.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Случаи негативного влияния неизвестны.

## **Способ применения и дозы**

Разовая доза: взрослым и детям старше 12 лет - 1 ампула по 2,2 мл. Применять в виде внутримышечных, подкожных, внутривенных (в акупунктурные точки) и при необходимости - внутривенных (струйно) инъекций 1-3 раза в неделю.

В острых случаях - 1 ампула ежедневно в течение 2-3 дней.

Курс лечения - 3-6 недель.

## **Дети**

Нет данных по применению препарата у детей до 12 лет.

## **Передозировка**

Не отмечалось.

### **Побочные реакции**

В редких случаях могут возникать реакции гиперчувствительности (или анафилактические реакции). Возможны кожные высыпания, изменения в месте введения.

### **Срок годности**

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

### **Упаковка**

5 ампул по 2,2 мл в картонной коробке.

### **Категория отпуска**

По рецепту.

### **Производитель**

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия/Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).