

Состав

действующие вещества: 100 г препарата содержат: Ambra grisea D4 – 11,11 г, Calcium carbonicum Hahnemanni D8 – 11,11 г, Cimicifuga racemosa D4 – 11,11 г, Gelsemium sempervirens D4 – 11,11 г, 11 г, Kalium carbonicum D4 – 11,11 г, Sepia officinalis D8 – 11,11 г, Urtica urens D3 – 11,11 г, Vitex agnus-castus D3 – 11,11 г;

вспомогательные вещества: этанол 96 %, вода очищенная.

Препарат содержит 54% об. этанола 96%.

1 мл препарата содержит 21 каплю.

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор от светло-желтого до светло-желтого цвета с запахом этанола.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Лекарственное средство регулирует нейрогормональную функцию женских половых органов. Обладает спазмолитическим, седативным и обезболивающим действием. Действие препарата основано на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет входящих в состав препарата веществ растительного, минерального и животного происхождения.

Показания

Предменструальный синдром, альгодисменорея.

Противопоказания

Детский возраст до 12 лет.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Лекарственное средство не применяют в период беременности или кормления грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестная.

Особенности применения

Пациенткам с менструальными расстройствами необходима консультация врача перед началом применения данного лекарственного средства.

При наличии симптомов, которые являются постоянными, неопределенными или возникшими недавно, необходимо проконсультироваться с врачом.

При нарушении менструального цикла необходимо проконсультироваться с врачом.

Мулимен может применяться подросткам до 18 лет только после консультации врача.

Это лекарственное средство содержит 54% об. этанола (алкоголя), то есть 213 мг/доза (10 капель), что эквивалентно 5 мл пива, 2 мл вина в дозе. Вреден для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожными при применении детям, пациентам с заболеванием печени и больным эпилепсией.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Лекарственное средство содержит этанол, который следует учитывать лицам, управляющим автотранспортом или работающим с другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Лекарственное средство не применяют в период беременности или кормления грудью.

Способ применения и дозы

Разовая доза для взрослых и девушек пубертатного возраста (от 12 лет) составляет 10–20 капель 3–5 раз в сутки за 15–20 минут до еды или через 1 час после еды. Капли следует растворить в 10 мл воды и выпить, задерживая на

несколько секунд во рту. В острых случаях принимать по 10 капель каждые 30 минут в течение первых 2-3 часов, затем перейти на вышеупомянутую дозировку, но не более 12 раз в день.

Курс лечения – 4-12 недель. Частоту приема и продолжительность курса определяет врач. Не принимайте двойную дозу, если вы забыли принять предыдущую.

Дети

Препарат рекомендован для использования девушкам пубертатного возраста.

Передозировка

Не отмечалось.

Побочные реакции

В редких случаях возможны временные аллергические реакции.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня указанного месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Картонная коробка содержит стеклянный флакон-капельницу по 50 мл.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Биология Хайльмиттель Хеэль ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия/Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).