

Состав

действующее вещество: natamycin;

1 pessaries содержит натамицину 100 мг

вспомогательные вещества: твердый жир, сорбитан триолеат, полисорбат 80, цетиловый спирт, натрия гидрокарбонат, адипиновая кислота.

Лекарственная форма

Пессарии.

Основные физико-химические свойства: пессарии от белого до светло-желтого цвета торпедообразное.

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробные и антисептические средства, применяемые в гинекологии, за исключением комбинированных препаратов, содержащих кортикостероиды.

Антибиотики. Натамицин. Код АТХ G01A A02.

Фармакодинамика

Натамицин является полиеновым антибиотиком широкого спектра действия, активным в отношении патогенных грибов, включая дрожжевые грибки, в частности *Candida albicans*, которые зачастую являются причиной инфицирования генитальных путей. Действует фунгицидно, связывая стеролы клеточных мембран, нарушая их целостность, приводит к гибели микроорганизмов.

Препарат не имеет сенсibiliзирующего эффекта. Не выявлено ни одного случая аллергии на натамицин во время лечения или при его промышленном производстве, также не наблюдалось развития резистентности к нему.

Препарат быстро и эффективно действует при инфицировании дрожжевыми грибами влагалища (кандидоз). Пессарии имеют терапевтический эффект также при наличии выделений из влагалища, воспалительного процесса и зуда, включая верхние, менее доступные отделы влагалища. Препарат быстро расплавляется во влагалище, образуя массу, которая пенится и способствует равномерному и полному распределению активной субстанции по всей поверхности влагалища.

Фармакокинетика

Существующими сегодня методами не удалось обнаружить в крови и биологических жидкостях организма натамицин, который применялся интравагинально, и его производные, свидетельствует об отсутствии системного действия препарата.

Показания

Вагинит, вызванный *Candida albicans*.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не известна.

Особенности применения

Во время менструации лечение следует прерывать. Во время терапии препаратом нет необходимости избегать половых контактов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат можно применять в период беременности и кормления грудью, поскольку натамицин не всасывается через кожу или слизистые оболочки.

Способ применения и дозы

Применять взрослым женщинам по 1 pessarii в течение 3-6 дней. Пессарии рекомендуется вводить во влагалище как можно глубже (в положении лежа) 1 раз в сутки (на ночь). В случае необходимости проведения лечения в течение нескольких дней курс терапии следует завершить до начала менструации или начинать лечение после ее окончания.

Дети

Натамицин в лекарственной форме pessarii не применять детям.

Передозировка

При применении pessariorum практически исключается системное воздействие, так как препарат не всасывается через слизистую оболочку.

Побочные реакции

Редко ($> 0,01\%$, $<0,1\%$)

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: реакции гиперчувствительности, жжение и раздражение.

Срок годности

2 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C .

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 3 pessarii в стрипе из пленки поливинилхлоридной, по 1 стрипу в картонной пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПАО «Монфарм», Украина

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 19100, Черкасская обл., г. Монастырище, ул. Заводская, 8.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).