

## **Состав**

*действующее вещество:* бензидамина гидрохлорид;

1 саше содержит 500 мг бензидамина гидрохлорида;

*вспомогательные вещества:* цетилтриметиламонию-пара-толуенсульфонат, повидон, натрия хлорид.

## **Лекарственная форма**

Гранулы для вагинального раствора.

*Основные физико-химические свойства:* гранулы от белого до почти белого цвета, однородные, без комочков и посторонних частиц.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Противовоспалительные средства для вагинального введения.

Код АТХ G02C C03.

## **Фармакодинамика**

Бензидамин является НПВП с анальгетическими и противоотечными свойствами. При местном применении обладает также антисептическим и местное анестезирующее активность.

## **Фармакокинетика**

С помощью Спектрофлуориметра показано, что бензидамин адгезируется на вагинальном эпителии и достигает концентраций  $9,7 \pm 6,24$  мкг / г. Постепенная абсорбция слизистыми оболочками обуславливает низкие уровни препарата в крови, которые являются недостаточными для причинения системных фармакологических эффектов. Выводится главным образом с мочой в виде неактивных метаболитов или конъюгированных продуктов.

## **Показания**

Вульвовагинит различного происхождения, характеризуется небольшими выделениями из влагалища, зудом, раздражением, изжогой и болью в наружных половых органах.

Женская гигиена в послеродовой период.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата, к салициловой кислоте и \ или другим НПВС.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Отсутствуют сообщения о каких-либо взаимодействиях с другими лекарственными средствами общего применения.

### **Особенности применения**

Лекарственное средство Тантум Роза® должен применяться местно для вагинального орошения. Не следует использовать этот препарат перорально.

Длительное применение препаратов для местного применения может привести к развитию феномена гиперчувствительности. В этом случае лечение следует прекратить и провести соответствующую терапию.

В случае вагинального кровотечения и / или лейкорее пациентке следует обязательно обратиться к врачу перед применением этого препарата.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат не оказывает никакого влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Отсутствуют противопоказания для местного применения бензидамина в период беременности или кормления грудью.

### **Способ применения и дозы**

Применяют 1 или 2 раза в день не более 7 дней. В случае устойчивости симптомов следует прекратить лечение и обратиться к врачу

Необходимо растворить содержимое 1-2 саше в 1 литре воды.

Процедуру орошения следует проводить лежа, жидкость должна оставаться во влагалище несколько минут.

## **Дети**

Не применять детям.

## **Передозировка**

Отсутствуют сообщения о передозировке бензидамина при местном применении.

## **Побочные реакции**

Редко, особенно при длительном применении препарата может возникать раздражение, местная гиперчувствительность в виде жжения. Иногда могут возникать сонливость, аллергические реакции, в том числе кожные высыпания, зуд, крапивница.

## **Срок годности**

5 лет.

## **Условия хранения**

Не требует особых условий хранения. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 10 саше в картонной коробке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

Азиенде Кимико Риуните Анджелине Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А., Италия.

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Виа Веккио дел Пиноккио, 22 - 60100 Анкона (АН), Италия.

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).