

Состав

действующие вещества: кислота салициловая, цинка оксид;

100 г пасты содержат салициловой кислоты - 2 г, цинка оксида - 25 г

крахмал картофельный, парафин белый мягкий.

Лекарственная форма

Паста.

Основные физико-химические свойства: однородная паста белого или белого с едва заметным желтоватым оттенком цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты со смягчающим и защитным действием. Препараты салициловой кислоты. Код АТХ D02A F.

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для наружного применения. Низкая концентрация салициловой кислоты, содержащейся в нем (2%), оказывает противовоспалительное, противомикробное и кератопластическое действие. Подавляет секрецию сальных и потовых желез. Цинка оксид проявляет слабую противомикробную, вяжущую, адсорбирующую действие, подсушивает кожу, что приводит к уменьшению экссудации и уменьшения местных проявлений воспаления и раздражения.

Фармакокинетика

При наружном применении салицилово-цинковая паста практически не абсорбируется в системный кровоток и не проявляет резорбтивного действия.

Показания

Кожные заболевания: дерматиты, опрелости, пиодермия, розовые угри, угревая сыпь, экзема, язвы с преобладанием экссудации.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Острые гнойные заболевания кожи и прилегающих тканей.

Особые меры безопасности. Не следует допускать попадания пасты в глаза. Если паста случайно попала в глаза, следует тщательно промыть их большим количеством проточной воды.

Не рекомендуется применять пасту на участки кожи, которые очень мокнут, а также при чрезмерной ее сухости.

Не рекомендуется применять при острых гнойных процессах. Не наносить на слизистые оболочки.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении с препаратами для наружного применения могут создаваться новые соединения с непредсказуемым эффектом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами не описан.

Применение в период беременности или кормления грудью

Безопасность и клиническую эффективность препарата при беременности и в период кормления грудью не изучали.

Способ применения и дозы

Взрослым пасту наносить на пораженную поверхность тонким слоем 2-3 раза в сутки. Продолжительность курса - от 6 до 20 суток.

Дети

Препарат не применять для лечения детей.

Передозировка

Усиление проявлений побочных реакций.

Побочные реакции

Возможны местные реакции (в том числе зуд, сыпь, жжение, сухость, шелушение кожи, крапивница, гиперемия). Аллергические реакции на компоненты пасты.

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С; не допускается замораживание. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Контейнеры по 25 г.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

69063, Украина, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).