

Состав

действующее вещество: натамицин;

1 таблетка содержит натамицину 100 мг;

вспомогательные вещества: крахмал картофельный; повидон, магния стеарат лактоза моногидрат, желатин; акация (гуммиарабик) метилпарагидроксибензоат (Е 218) кальция карбонат; каолин; тальк целлюлозы ацетилфталат; триацетин; опаглос 6000 (шеллак, воск белый, воск карнаубский) титана диоксид (Е 171) сахара.

Лекарственная форма

Таблетки кишечнорастворимой.

Основные физико-химические свойства: таблетки белого цвета, покрытые оболочкой.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кишечных инфекциях. Антибиотики. Натамицин. Код АТХ А07А А03.

Фармакодинамика

Натамицин - это полиеновый антибиотик широкого спектра действия, активен в отношении патогенных грибков, включая дрожжевые грибки и особенно *Candida albicans*.

Препарат не имеет сенсibiliзирующие способности. Не выявлено ни одного случая аллергии на натамицин во время лечения лекарственным средством или при его промышленного производства и не наблюдалось развития резистентности к нему.

Фармакокинетика

Натамицин практически не всасывается из желудочно-кишечного тракта.

Показания

Грибковые заболевания кишечника.

Противопоказания

Гиперчувствительность к любым компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не описано.

Особенности применения

Применение натамицина может вызвать приступы порфирии, поэтому для таких больных прием лекарственного средства считается опасным.

Поскольку препарат содержит лактозу, его не следует применять пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Лекарственное средство содержит сахарозу, что следует учитывать больным сахарным диабетом. Поскольку в состав лекарственного средства входит сахароза, его не следует применять пациентам с редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость фруктозы или недостаточность сахарозы-изомальтозы.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Лекарственное средство можно применять в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Для лечения кандидоза кишечника взрослым назначать по 1 таблетке 4 раза в сутки. Обычно терапия длится 1 неделю.

Детям в возрасте от 3 лет назначать по 1 таблетке 2 раза в сутки. Из-за особенностей фармакодинамических и фармакокинетических свойств натамицина рекомендована одинаковая доза для детей всех возрастов. Обычно продолжительность лечения составляет 1 неделю.

Дети

Лекарственное средство можно применять детям в возрасте от 3 лет.

Передозировка

Нет сообщений.

Побочные реакции

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота и диарея (возникающие в первые дни приема таблеток и исчезают самостоятельно при лечении).

Возможны реакции гиперчувствительности.

Срок годности

4 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 таблеток в банке, по 1 банке в картонной пачке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Астеллас Фарма Юроп Б.В.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Хогемат 2, 7942 ДЖ Меппел, Нидерланды.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).