Состав

действующие вещества: 1 г пасты содержит кислоты салициловой 0,02 г, цинка оксида 0,25 г

крахмал картофельный, парафин белый мягкий.

Лекарственная форма

Паста.

Основные физико-химические свойства: однородная масса белого цвета с желтым оттенком.

Фармакотерапевтическая группа

Дерматологические средства. Лекарственные средства со смягчающим и защитным действием. Лекарственные средства, содержащие салициловую кислоту.

Код ATX D02A F.

Фармакодинамика

Комбинированное лекарственное средство для наружного применения, действие которого обусловлено лечебными свойствами составных частей лекарственного средства. Салициловая кислота оказывает противовоспалительное, антисептическое и умеренное местнораздражающее действие. Цинк оказывает слабое противомикробное, вяжущее, адсорбирующее действие, подсушивает кожу приводит к уменьшению экссудации и способствует уменьшению местных проявлений воспаления и раздражения.

Фармакокинетика

При наружном применении салицилово-цинковая паста практически не абсорбируется в системный кровоток и не оказывает резорбтивного действия.

Показания

Кожные заболевания: дерматиты, опрелости, пиодермия, розовые угри, угревая сыпь, экзема, язвы с преобладанием экссудации.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Острые гнойные заболевания кожи и прилегающих тканей.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении с лекарственными средствами для наружного применения могут образовываться новые соединения с непредсказуемым эффектом.

Особенности применения

Не следует допускать попадания пасты в глаза и в раны. Если паста случайно попала в глаза, следует тщательно промыть их большим количеством проточной воды.

Не рекомендуется применять пасту на участки кожи, которые очень мокнут, а также при чрезмерной ее сухости.

Не применять при острых гнойных процессах. Не наносить на слизистые оболочки.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременным и женщинам в период кормления грудью применение лекарственного средства не рекомендуется.

Способ применения и дозы

Применяют взрослым наружно. Пасту наносят в виде аппликаций на пораженные участки кожи 1-2 раза в день.

Продолжительность курса лечения определяется в зависимости от характера заболевания и составляет примерно от 6 до 20 суток.

Дети

Препарат не применяют для лечения детей.

Передозировка

При нанесении на значительные участки кожного покрова на длительное время возможно усиление аллергической реакции.

В этом случае больному следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции, включая зуд, сыпь, жжение, сухость, шелушение кожи, крапивница, гиперемия. Аллергические реакции на компоненты пасты.

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 г в тубах без пачки.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «Тернофарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.

Источник инструкции