

Состав

действующее вещество: 1 г геля содержит Rhus toxicodendron extern 0,05 г; Ledum extern 0,05 г; Symphytum ad usum externum 0,10 г;

вспомогательные вещества: натрия гидроксид, карбомер, вода очищенная.

Лекарственная форма

Гель.

Основные физико-химические свойства: желто-коричневого цвета гомогенный, прозрачный гель со сладковатым, слегка пряным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Препарат содержит три активных ингредиента, дополняющих друг друга при лечении ревматических болей в мышцах и суставах, болезненных напряжений и растяжений мышц, а также люмбаго (боль в пояснично-крестцовом отделе позвоночника). Rhus toxicodendron хорошо зарекомендовал себя в лечении суставного ревматизма, развившегося вследствие простуды, промокания или перенапряжения с уменьшением болезненных симптомов при движении. Активное вещество Ledum эффективно главным образом при ревматоидных болях в мелких и крупных суставах, а также при предрасположенности к подагре. Благодаря воздействию Ledum снимается перенапряжение опорной мускулатуры позвоночника, а также затылочных и плечевых мышц. Завершает комбинацию Symphytum, который также применяется при болезненных симптомах в суставах и издавна считается гомеопатическим средством для лечения костей и суставов.

Показания

Ревматические и дегенеративные заболевания мышц и суставов, болезненное напряжение и растяжение мышц, а также люмбаго (боль в пояснично-крестцовом отделе позвоночника).

Противопоказания

Не применять при повышенной чувствительности к *Rhus toxicodendron* (сумаха ядовитого) и другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

До настоящего времени не выявлена. Если пациент применяет какое-либо другое лекарственное средство, следует предупредить об этом врача.

Особенности применения

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение симптомов заболевания. В этом случае пациенту следует прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом. В случае затяжного течения заболевания или неясных, новых жалоб или острых состояний, сопровождающихся покраснением, отеком или гиперемией сустава, пациенту следует проконсультироваться с врачом относительно дальнейшего применения препарата. Следует избегать контакта с глазами, слизистыми оболочками и открытыми ранами. Следует вымыть руки после нанесения геля. Если пациент не чувствует себя лучше, необходимо обратиться к врачу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Ревма-Гель в период беременности или кормления грудью следует применять только после тщательной оценки врачом соотношения польза для матери/риск для плода (ребенка).

Способ применения и дозы

При острых симптомах заболевания взрослым и детям с 1 года наносить гель 3 раза в день на болезненные места тонким слоем, слегка втирая в кожу. Длительность применения препарата – не более 2 недель.

При хроническом течении заболевания наносить гель 1-2 раза в день на болезненные места тонким слоем, слегка втирая в кожу. Наносимое при этом количество препарата не должно превышать 10-15 мм выдавливаемой из тюбика полоски геля.

Если по истечении 1-2 недель лечения препаратом не наблюдается терапевтического эффекта, пациенту следует обратиться к врачу.

Дети

Ввиду недостаточных клинических данных не рекомендуется применять препарат детям до 1 года.

Передозировка

Вредные воздействия повышенных доз неизвестны.

Побочные реакции

Изредка могут наблюдаться аллергические реакции, включая покраснение кожи, раздражение кожи, зуд, кожные высыпания. В случае возникновения любых нежелательных реакций пациенту следует прекратить лечение и проконсультироваться с врачом.

Срок годности

5 лет.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г геля в тубе, по 1 тубе в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).