

Состав

действующее вещество: метилсалицилат;

1 г мази содержит метилсалицилата 61,1 мг;

вспомогательные вещества: масло терпентиновое, камфора рацемическая, ментол (левоментол), парафин белый мягкий, ланолин.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: мазь маслянистая на ощупь желтоватого цвета, с характерным запахом и однородная на вид.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли. Средства, содержащие производные салициловой кислоты. Код АТХ М02А С.

Фармакодинамика

Является отвлекающим средством и применяется для временного облегчения глубокой боли.

Местное нанесение мази, содержащей метилсалицилат на болезненные суставы, пораженные артритом, приводит к значительному уменьшению напряжения мышц.

После местного применения метилсалицилат проникает через неповрежденную кожу и оказывает системное действие; количества адсорбированного препарата достаточно, чтобы обеспечить выраженный обезболивающий эффект.

Показания

В составе комплексной терапии при:

- слабой и умеренной мышечной боли;
- заботах;
- слабой и умеренной боли при остеоартрозе и остеоартрите;
- слабой и умеренной боли в суставах;
- умеренных выраженных воспалительных процессах опорно-двигательной системы.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к салицилатам и другим компонентам препарата;
- одновременное лечение с применением варфарина;
- беременность и период кормления грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Одновременное применение препарата и приема варфарина потенцирует действие последнего, что ведет к гематологическим изменениям.

Особенности применения

Препарат предназначен только для наружного применения.

Избегать нанесения на чувствительную или поврежденную кожу, а также на большую площадь.

Ланолин в составе мази может вызвать кожные реакции (контактный дерматит). Абсорбция усиливается под действием тепла или физической нагрузки. Упаковка содержит латексный уплотнитель, может вызвать аллергические реакции у чувствительных лиц.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано применять препарат в эти периоды из-за отсутствия достаточного количества данных наблюдений.

Способ применения и дозы

Наносить на поврежденный участок примерно 1-2 г препарата 3 раза в день.

Продолжительность лечения не должна превышать 2 недели.

Дети

Препарат не предназначен для применения детьми из-за недостаточности опыта применения этой категорией пациентов.

Передозировка

При наружном применении передозировка препаратом практически невозможно, так как количество препарата, находящегося в одной упаковке не представляет угрозу передозировки.

При *случайном приеме внутрь* возможны тошнота, рвота, колики, головная боль, головокружение, чувство жара, бред, мышечные сокращения, судороги, депрессия нервной системы вплоть до комы.

Лечение: промывание желудка, применение солевых слабительных средств (сульфат натрия 30 г / 250 мл), большие объемы жидкости помогут избежать нарушения функции почек.

При передозировке следует обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Побочные реакции

Аллергия и повышенная чувствительность к препарату наблюдаются редко. Из них наиболее часто проявляются местные побочные реакции на уровне местного применения: сыпь, жжение, боль, покраснение и зуд.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в защищенном от света месте в плотно закрытой тубе.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 г или по 50 г в тубе. По 1 тубе в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Лабораториес Басе Индастриа Фармасьютика, С.А.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Парк Индастриал Мануэль Лоренсо Феррейра, уч. 15, 16, 3450-232, Мортагуа, Португалия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).