

Состав

действующее вещество: камфора рацемическая;

1 мл камфоры рацемической 0,1 г

вспомогательные вещества: масло подсолнечное.

Лекарственная форма

Раствор масляный 10%, накожный.

Основные физико-химические свойства: прозрачная маслянистая жидкость желтого цвета с запахом камфары.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли.

Код АТХ М02А Х10.

Фармакодинамика

Камфорная масло при местном применении оказывает противомикробное, противовоспалительное, отвлекающее, обезболивающее действие и устраняет зуд кожи. Эти свойства обусловлены наличием в молекуле камфоры функционально активной молекулы кислорода, которая имеет высокий окислительный потенциал, нарушает клеточные мембраны микроорганизмов, разрушает много активных соединений, вызывающих воспаление, боль и раздражение чувствительных рецепторов кожи.

Фармакокинетика

Не изучали.

Показания

Назначать при ревматизме, артритах, артралгии, миозитах, миалгии, ишиасе, кожном зуде.

Противопоказания

Бронхиальная астма, повреждения кожи при ожогах, нарушение целостности кожи, гнойничковые заболевания кожи. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Взаимодействие пока неизвестно.

Особенности применения

Камфорная масло является традиционным лекарственным средством растительного происхождения для применения в соответствии с показаниями, подтвержденных длительным применением.

Пользователь должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства или наблюдаются побочные реакции, не указанные в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не исследовалось.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применять с учетом соотношения польза для / риск для плода (ребенка), которое определяет врач.

Способ применения и дозы

Камфорное масло применять наружно взрослым как отдельно, так и в комбинации с метилсалицилатом, скипидаром и другими лекарственными средствами для местного применения. Применять наружно для растирания и компрессов при указанных патологических процессах. Способ применения, количество аппликаций, продолжительность одной аппликации обусловленные характером заболевания, его выраженностью, характером сопутствующей терапии.

Дети

Не применять детям из-за отсутствия клинического опыта.

Передозировка

Возможно усиление проявлений побочных реакций, чувство сильного тепла и жжение.

При случайном попадании внутрь возможны боли в животе, тошнота, рвота, диарея, симптомы угнетения центральной нервной системы, головокружение, атаксия, судороги, приливы, сонливость, затруднение дыхания.

Побочные реакции

Со стороны кожи: аллергические реакции, включая сыпь, крапивницу, зуд, раздражение кожи, покраснение, дерматит, в том числе контактный дерматит.

Со стороны нервной системы: судороги.

Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 мл в флаконах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).