

## **Состав**

*действующие вещества:* 1 таблетка содержит 20 мг сухого экстракта корневища цимицифуги (*Cimicifuga rhizome*) (5-10: 1), что соответствует 2,8 мг нативного экстракта (экстрагент этанол 58% (об/об));

*вспомогательные вещества:* лактоза моногидрат, крахмал картофельный; магния стеарат кальция гидрофосфат дигидрат; тальк, титана диоксид (E 171), железа оксид желтый (E172), железа оксид красный (E172), макрогол 6000; аммонийно-метакрилатный сополимер.

## **Лекарственная форма**

Таблетки, покрытые оболочкой.

*Основные физико-химические свойства:* круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой, терракотового цвета с гладкой поверхностью.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые в гинекологии. Цимицифуги корневища. Код АТХ G02CX04.

## **Фармакодинамика**

Растительный препарат для лечения пременопаузальных и климактерических расстройств.

Экстракт цимицифуги положительно влияет на нейровегетативную систему и снижает уровень психоэмоциональных расстройств в климактерический период. Применение препарата способствует ослаблению или полному исчезновению симптомов болезни у пременопаузальной и климактерической периоды, в том числе таких как приливы и обильное потоотделение.

## **Фармакокинетика**

Данные отсутствуют.

## **Показания**

Нейровегетативные расстройства в период менопаузы (приливы, повышенная потливость, нарушение сна, повышенная раздражительность, перепады

настроения, апатия).

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата. Эстрогензависимые опухоли.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

При одновременном приеме эстрогенов Климадинон® может усилить их действие (см. инструкции «Особенности применения»).

## **Особенности применения**

Больным с нарушениями функции печени в анамнезе следует принимать препарат с осторожностью. При появлении признаков поражения печени (повышенная утомляемость, потеря аппетита, пожелтение кожи и глаз или сильная боль в верхней части живота с тошнотой и рвотой или темная моча) следует прекратить применение препарата Климадинон® и срочно обратиться к врачу.

При нарушении или возобновлении менструаций, а также в случае длительных менструаций или других жалоб, возникающих во время лечения, необходимо обратиться к врачу для просмотра схемы лечения.

Женщинам репродуктивного возраста необходимо применять эффективные противозачаточные средства.

Не следует применять Климадинон® без консультации врача, если пациентка уже принимает женские половые гормоны (эстрогены).

Если во время приема Климадинона® симптомы ухудшаются, необходимо обратиться к врачу.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

*Примечание для больных сахарным диабетом.* 1 таблетка содержит в среднем 0,01 ХЕ (ХО).

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Безопасность цимицифуги в период беременности и кормления грудью не установлена, поэтому не следует применять Климадинон® в этот период.

## **Способ применения и дозы**

Если врач не назначил иначе, женщинам в период менопаузы принимать по 1 таблетке 2 раза в сутки (утром и вечером).

Таблетки следует глотать, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости. Не следует принимать двойную дозу, если пациентка пропустила 1 прием.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально. Если симптомы не исчезают во время лечения, следует обратиться к врачу.

Не следует применять препарат более 6 месяцев без консультации врача.

## **Дети**

Для лечения детей препарат не применять.

## **Передозировка**

Случаи передозировки неизвестны.

При приеме доз, превышающих рекомендуемые, следует сообщить об этом врачу для принятия необходимых мер. В случае передозировки необходимо проводить симптоматическую терапию.

## **Побочные реакции**

При применении препаратов, содержащих цимицифугу, наблюдались случаи желудочно-кишечных расстройств (в том числе диспепсические расстройства, диарея, тошнота, рвота), аллергические реакции (включая сыпь, зуд, крапивница), отек лица и периферические отеки. С применением препаратов, содержащих цимицифугу связывают гепатотоксичные реакции (включая гепатит, желтуху, нарушения лабораторных показателей функции печени). Были сообщения об ощущении напряжения в грудных железах и менструальноподобном кровотечении.

В случае возникновения каких-либо побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

### **Срок годности**

4 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 ° С в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 15 таблеток в блистере, по 4 блистера № 60 (15x4) в картонной коробке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Бионорика СЕ / Bionorica SE.

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Керхенштейнерштрассе, 11-15, 92318, г.. Ноймаркт, Германия /

Kerschensteinerstrasse, 11-15, 92318 Neumarkt, Germany.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).