

Состав

действующие вещества: 100 г препарата содержат

Moschus moschiferusD30 – 0,5 г;
Moschus moschiferusD6 – 0,5 г;
Moschus moschiferusD200 – 0,5 г;
Strychnos ignatiiD4 – 0,5 г;
Strychnos ignatiiD30 – 0,5 г;
StrychnosignatiiD10 – 0,5 г;
Strychnos ignatiiD200 – 0,5 г;

вспомогательные вещества:

этанол 96 %;
вода очищенная.

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: прозрачный (при хранении возможно образование хлопьевидного осадка) бесцветный раствор с запахом этанола.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Препарат оказывает седативное, спазмолитическое, антидепрессивное действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного и животного происхождения, которые входят в состав препарата.

Показания

- Депрессия, особенно экзогенного происхождения;
- парадоксальные симптомы;
- истеричная афония.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любым компонентам препарата.

Надлежащие меры безопасности при применении

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат. При сохранении симптомов или ухудшении состояния, в случае одышки, гнойной мокроты, лихорадки или боли при дыхании необходимо проконсультироваться с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Совместим с другими лекарственными средствами.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Обычно не влияет, но следует учитывать наличие в составе препарата этанола.

Применение в период беременности или кормления грудью

Из-за недостаточности надлежащего задокументированного опыта применения, препарат можно применять в период беременности или кормления грудью лишь после консультации с врачом. Токсичность в период беременности или кормления грудью гомеопатически разведенных веществ, которые входят в состав данного лекарственного средства, не установлена. Никаких нежелательных реакций не обнаружено.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым и детям от 12 лет – 10 капель, от 2 до 6 лет – 5 капель, от 6 до 12 лет – 7 капель 3 раза в день за 15-20 минут до еды или через 1 час после еды. Капли растворить в 10 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту (можно не растворять, а сразу капать под язык). В острых случаях сначала необходимо принимать возрастную разовую дозу каждые 30-60 минут в течение первых суток, но не более 9 раз в сутки. Далее принимать возрастную разовую дозу 3 раза в сутки. Долговременное применение препарата (в течение нескольких месяцев и дольше) следует проводить под наблюдением врача. Обычно курс лечения - 3-6 недель, но длительность лечения определяется врачом индивидуально.

Дети

Из-за недостаточности надлежащего задокументированного опыта применения, данное лекарственное средство не следует применять детям в возрасте до 12 лет без назначения врача.

Передозировка

Не отмечалась.

Побочные реакции

У лиц с повышенной чувствительностью возможно возникновение аллергических реакций.

Срок годности

5 лет. Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте.

Упаковка

Картонная коробка содержит стеклянный флакон-капельницу по 30 мл.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).