

Состав

действующие вещества: 1 таблетка содержит Acidum phosphoricum D4 - 60 мг, Kalium bromatum D4 - 30 мг, Psorinum Nosode D12 - 60 мг, Sepia officinalis D4 - 60 мг, Strychnos ignatii D4 - 60 мг, Zincum isovalerianicum D4 - 30 мг;

вспомогательные вещества: магния стеарат лактоза.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: круглые плоские таблетки с фаской, белого цвета с сероватым оттенком, возможны темные вкрапления, с отсутствием запаха до слабого запаха валерианы.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Лекарственное средство обладает успокаивающим, снотворным, антидепрессивным и противосудорожным действием. Действие препарата основано на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного и минерального происхождения, входящих в его состав.

Показания

Невротический синдром, тревожность и нарушения сна, климактерический невроз, психосоматические заболевания, депрессии, психозы (острые и хронические).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Особенности применения

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует его применять.

Если состояние не улучшается или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

В начале лечения возможно кратковременное обострение имеющихся симптомов заболевания (первичная реакция). Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Неизвестна.

Применение в период беременности или кормления грудью

Случаи негативного влияния на плод/ребенка неизвестны. Возможность применения лекарственного средства определяет врач, если польза превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым и детям старше 6 лет - 1 таблетка под язык (до полного рассасывания). Разовую дозу принимать 3 раза в день за 15-20 минут до еды или через 1 час после еды.

При острых расстройствах (острая психоэмоциональная нагрузка) принимать разовую дозу каждые 15 минут в течение первых 2 часов. Далее перейти на прием 3 раза в сутки.

Целесообразность применения лекарственного средства более 5 дней зависит от степени тяжести течения заболевания и определяется врачом индивидуально.

Дети

Препарат рекомендован для применения детям в возрасте от 6 лет.

Применение лекарственного средства детям до 6 лет возможно исключительно после консультации с врачом.

Передозировка

Не отмечалось.

Побочные реакции

У лиц с повышенной чувствительностью к компонентам препарата возможно развитие аллергических реакций.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

Условия хранения

Специальных условий хранения не требует. Закрывать контейнер с таблетками после применения, защищать от влаги.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

50 таблеток в полипропиленовом контейнере, в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).