

Состав

действующие вещества: стрептокиназа, стрептодорназа;

1 суппозиторий содержит стрептокиназы 15000 МЕ, стрептодорназы 1250 МЕ;

вспомогательные вещества: масло минеральное, твердый жир.

Лекарственная форма

Суппозитории ректальные.

Основные физико-химические свойства: суппозитории цилиндрично-конической формы от белого до бежевого цвета. На срезе допускается наличие воздушно-пористого стержня и лункообразной выемки.

Фармакотерапевтическая группа

Гематологические средства. Ферменты. Комбинации с стрептокиназой. Код АТХ В06А А55.

Фармакодинамика

Лекарственное средство «СК-СД, стрептокиназа-стрептодорназа», суппозитории, действует местно после ректального применения. Стрептокиназа действует как фибринолитика и растворяет фибриновый и другие сгустки. Стрептодорназа растворяет дезоксирибонуклеопротеиды и дезоксирибонуклеокислоты, в результате чего снижается вязкость гнойных экссудатов и растворяются мертвые клетки.

Фармакокинетика

Стрептокиназа и Стрептодорназа действует местно на кровяные сгустки, гнойные и некротические части клеток и тканей. Лекарственное средство применяется ректально и не всасывается в кровяное русло.

Стрептокиназо-плазминогенный комплекс постепенно превращается в полипептиды. Продукты распада вместе с другими фрагментами субстратов механически удаляются. Стрептодорназа после полимеризации ДНК превращается в нуклеотидную смесь и механически удаляется с частями мертвых клеток.

Показания

- Хронические воспалительные процессы маточных придатков;
- послеоперационные инфильтративные поражения органов малого таза;
- эндометрит;
- геморрое при остром и хроническом течении;
- параректальные абсцессы и свищи с воспалительной инфильтрацией;
- гнойные каудальные кисты.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к действующим веществам или вспомогательным веществам препарата;
- наличие свежей раны, хирургического шва или кровотечения до 10 дней (это может повлечь расслабление швов и, как следствие, кровотечение из раны);
- одновременное применение с антикоагулянтами, что может привести к местным кровотечениям;
- нарушение свертываемости крови.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Лекарственное средство «СК-СД, стрептокиназа-стрептодорназа» противопоказано применять с антикоагулянтами, так как возможны кровотечения.

Особенности применения

Препарат может вызвать местные раздражения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет на способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Влияние лекарственного средства «СК-СД, стрептокиназа-стрептодорназа» на фертильность, беременность и период кормления грудью не изучался.

Способ применения и дозы

Дозировка

Курс лечения 4-18 суппозиториев. Продолжительность курса: 2-9 суток.

Дозировка назначает врач в соответствии с интенсивностью воспалительного процесса.

При тяжелом и хроническом течении заболевания:

- по 1 суппозиторию 3 раза в сутки в течение первых 3 суток;
- по 1 свече 2 раза в сутки в течение последующих 3 суток;
- по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение еще 3 следующих суток.

Курс лечения: 9 дней, 18 суппозиториев.

При среднетяжелом течении заболевания:

- по 1 свече 2 раза в сутки в течение первых 3 суток;
- по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение следующих 4 суток,

Курс лечения 7 дней, 10 суппозиториев.

При легком течении заболевания:

- по 1 свече 2 раза в сутки в течение 2 суток.

Курс лечения: 2 дня, 4 суппозитории.

В случае отсутствия результата или в случае наступления рецидивом врач должен определить необходимость повторного курса лечения.

Способ применения

Ректально. Суппозитории вводить глубоко в прямую кишку предварительно вынуть суппозиторий из блистера. Перед и после применения препарата следует тщательно вымыть руки.

Дети

Препарат не назначается детям.

Передозировка

Данные о передозировке стрептокиназы и стрептодорназы отсутствуют.

Побочные реакции

Иногда могут наблюдаться: местная боль, отек или незначительное кровотечение, раздражение, диарея, аллергические реакции, повышение температуры тела.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить при температуре 2-8 °С в оригинальной упаковке. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 6 суппозитория в блистере, по 1 блистеру в картонной упаковке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Фармина Лтд.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Ул. Липски 44, 30-721, г.. Краков, Польша.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).