

## **Состав**

*действующие вещества:* 100 мл сиропа содержат пихты масла - 0,419 г, мяты перечной масла - 0,105 г, моркови дикой плодов экстракта жидкого Extractum fructum Dauci sativi fluidum (1:1) (экстрагент 96% этанол) - 1,204 г, хмеля шишек экстракта жидкого Extractum fructum Strobili lupuli fluidum (1: 1) (экстрагент 96% этанол) - 1,726 г, душицы травы экстракта жидкого Extractum herbae Origani fluidum (1:1) (экстрагент 96% этанол) - 1,195 г;

*вспомогательные вещества:* полисорбат 80; кислота лимонная моногидрат, сорбиновая кислота; сироп сахарный; трилон Б; вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Сироп.

*Основные физико-химические свойства:* жидкость светло-желтого цвета с зеленоватым оттенком, со специфическим запахом. Допускается опалесценция.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые в урологии. Код АТХ G04В Х.

## **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат растительного происхождения. Составляющие препарата Уролесан уменьшают воспалительные явления в мочевыводящих путях и почках, способствуют усиленному кровообращению почек и печени, имеют диуретическое, антибактериальное, желчегонное действие, образуют защитный коллоид в моче и нормализуют тонус гладкой мускулатуры верхних мочевыводящих путей и желчного пузыря. Уролесан увеличивает выделение мочевины и хлоридов, способствует выведению мелких конкрементов и песка из мочевого пузыря и почек.

## **Фармакокинетика**

Препарат хорошо всасывается, действие его начинается через 20-30 минут и продолжается 4-5 часов. Максимальный эффект наступает через 1-2 часа. Выводится через пищеварительный тракт и почки.

## **Показания**

Острые и хронические инфекции мочевыводящих путей и почек (цистит и пиелонефрит); мочекаменная болезнь и мочекислый диатез (профилактика образования конкрементов после их удаления) хронические холециститы (в том числе калькулезные), дискинезии желчных путей, желчекаменная болезнь.

### **Противопоказания**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- дети с судорогами в анамнезе (фебрильная или нет).

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не изучалась.

### **Особенности применения**

Не использовать в случае, когда диаметр конкрементов превышает 3 мм.

Пациентам с сахарным диабетом, а также пациентам с повышенным содержанием глюкозы в крови необходимо быть осторожными, применяя Уролесан (в состав препарата входит сахарный сироп).

С осторожностью применять больным бронхиальной астмой из-за риска возникновения бронхоспазма.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не изучалось.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Применение препарата в период беременности и кормления грудью не изучалось.

### **Способ применения и дозы**

Препарат принимают внутрь перед едой.

*Рекомендуемые дозы для взрослых:* по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа 3 раза в сутки. При острых состояниях (в т.ч. при почечных и печеночных коликах)

продолжительность курса терапии составляет от 5 до 7 дней, при хронических состояниях - от 7 дней до 1 месяца. При возникновении почечной и печеночных колик разовую дозу можно однократно повысить до 2 чайных ложек (10 мл), после этого на следующий прием вернуться к обычной разовой дозе (5 мл).

*Рекомендуемые дозы для детей:* 2-7 лет - по 2-4 мл 3 раза в сутки; 7-14 лет - по 4-5 мл 3 раза в сутки. Дозировка производится с помощью шприца-дозатора.

## **Дети**

Препарат не применять детям до 2 лет.

## **Передозировка**

При передозировке возможны тошнота, головокружение.

*Лечение:* интенсивное теплое питье, покой, активированный уголь, атропина сульфат (0,0005-0,001 г).

## **Побочные реакции**

Обычно Уролесан хорошо переносится. При применении препарата возможны:

- *со стороны пищеварительного тракта:* диспепсические явления (включая тошноту, рвоту);
- *со стороны иммунной системы:* аллергические реакции, включая зуд, покраснение лица, сыпь, крапивница, ангионевротический отек (чувство жжения во рту, затруднение дыхания, отек лица, языка), анафилактический шок;
- *со стороны центральной и периферической нервной системы:* головокружение, общая слабость, головная боль, атаксия, тремор;
- *со стороны сердечно-сосудистой системы:* артериальная гипотензия, гипертензия, брадикардия.

## **Срок годности**

2 года.

## **Условия хранения**

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. После открытия хранить не более 28 суток при температуре от 2 °С до 8 °С. Перед употреблением взбалтывать. Хранить в недоступном для детей месте.

**Упаковка**

По 180 мл во флаконе. По 1 флакону в пачке.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ПАТ «Галичфарм».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 79024, г. Львов, ул. Опришковская, 6/8.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).