Состав

действующие вещества: 1 мл препарата содержит водно-спиртовой экстракт (1: 1) (экстрагент - этанол 40%) из смеси: моркови дикой плодов (Dauci carotae fructus) 200 мг, ортосифона тычиночного листьев (Orthosiphonis staminei Foli) 180 мг, спорыша травы (Polygoni avicularis herba) 150 мг, кукурузы столбиков с рыльцами (Zeae maydis styli cum stigmatis) 120 мг, бузины черной цветков (Sambuci nigrae flores) 100 мг, хвоща травы (Equiseti herba) 100 мг, хмеля шишек (Lupuli flos) 50 мг, березы почек (Betulae gemmae) 50 мг, зверобоя травы (Hyperici herba) 40 мг, мяты листьев (Menthae piperitae folia) 10 мг

вспомогательные вещества: кроме экстрагента, отсутствуют.

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: жидкость темно-коричневого цвета со специфическим ароматным запахом. При хранении допускается образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в урологии. Код ATX G04B X.

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения. Комплекс биологически активных веществ Урохолума, легко всасываясь в кровь и стимулируя почечный и печеночный кровоток, способствует увеличению моче и желчеотделение, нормализует тонус гладкой мускулатуры верхних мочевыводящих путей и желчного пузыря, ослабляет воспалительные процессы, оказывает бактерицидное, диуретическое, желчегонное, спазмолитическое действие.

УРОХОЛУМ оказывает антиазотемическим эффект, выводит из организма мочевину, мочевую кислоту, хлориды. Способствует выведению песка и камней из почек, мочевого и желчного пузырей.

Показания

В составе комплексной терапии острых и хронических заболеваний (неспецифической инфекции) мочевыводящих путей (цистит, уретрит) и почек (пиелонефрит), хронических неинфекционных заболеваний почек (нефрит, нефроз) мочекаменная, почечнокаменная болезни и солевой диатез (профилактика образования конкрементов, в т.ч. после их удаления) хронический холецистит, дискинезия желчевыводящих путей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Изменение реологических свойств крови, обтурационная желтуха.

Особые меры безопасности

С осторожностью применять пациентам с желудочно-пищеводного рефлюкса (изза возможного возникновения и / или усиления изжоги).

Не использовать, если диаметр камней превышает 3 мм.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не установлена.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Во время лечения следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат применяют в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет принимать перед едой по 10-20 капель, разводя небольшим количеством воды, трижды в сутки.

Курс лечения определяется врачом с учетом течения заболевания, характера сопутствующей терапии и длится от 5 дней до 1 месяца. По назначению врача курс терапии можно повторить.

Перед применением взболтать, поскольку при хранении возможно образование осадка.

Дети

Препарат применяют детям в возрасте до 12 лет.

Передозировка

Усиление побочных реакций.

Печение: при передозировке необходимо назначить большое количество теплого питья и провести симптоматическое лечение.

Побочные реакции

Аллергические реакции (в т.ч. кожная сыпь, зуд, гиперемия, отек кожи), головокружение, диспепсические явления (тошнота, рвота).

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 40 мл во флаконе в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ГКП« Фармацевтическая фабрика ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — Государственного реестра лекарственных средств Украины.