Состав

действующие вещества: 1 мл препарата содержит пихты масла (*oleum Abies*) – 67,60 мг; масла мяты перечной (*oleum Menthae piperitae*) – 16,90 мг; моркови дикой плодов экстракта жидкого (*extractum fructuum Dauci sativi fluidum*) (1:1) – 194,35 мг; хмеля шишек экстракта жидкого (*extractum fructuum Strobili lupuli fluidum*) (1:1) – 278,80 мг; душицы травы экстракта жидкого (*extractum herbae Origani fluidum*) (1:1) – 192,95 мг;

вспомогательные вещества: динатрия эдетат, касторовое масло.

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: жидкость от зеленовато-коричневого до коричневого цвета, с характерным запахом мяты.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в урологии. Код АТХ G04B X.

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения. Составляющие препарата Уролесан® уменьшают воспалительные явления в мочевыводящих путях и почках, способствуют усиленному кровоснабжению почек и печени, оказывают диуретическое, антибактериальное, желчегонное действие, образуют защитный коллоид в моче и нормализуют тонус гладкой мускулатуры верхних мочевых путей и желчного пузыря.

Уролесан® увеличивает выделение мочевины и хлоридов, способствует выведению мелких конкрементов и песка из мочевого пузыря и почек.

Фармакокинетика

Препарат хорошо всасывается, действие его начинается через 20-30 минут и продолжается 4-5 часов. Максимальный эффект наступает через 1-2 часа. Выводится через пищеварительный тракт и почками.

Показания

Острые и хронические инфекции мочевыводящих путей и почек (циститы и пиелонефриты); мочекаменная болезнь и мочекислый диатез (профилактика образования конкрементов после их удаления); хронические холециститы (в том числе калькулезные), дискинезии желчных путей, желчекаменная болезнь.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- дети с судорогами в анамнезе (фебрильными или нет).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не изучалось.

Особенности применения

Не применять препарат в случае, если диаметр конкрементов превышает 3 мм.

С осторожностью применять больным бронхиальной астмой из-за риска возникновения бронхоспазма.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не изучалась.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение препарата в период беременности или кормления грудью не изучалось.

Способ применения и дозы

Препарат принимать внутрь перед едой.

Рекомендованная доза для взрослых: по 8-10 капель (на сахар, для пациентов с сахарным диабетом – на хлеб) 3 раза в сутки. При почечных и печеночных коликах разовая доза составляет 15-20 капель. Продолжительность приема

составляет от 5 до 7 дней, при хронических состояниях от 7 дней до 1 месяца.

Рекомендованная доза для детей 7-14 лет: по 5-6 капель (на сахар, для пациентов с сахарным диабетом – на хлеб) 3 раза в сутки.

Разовую дозу, частоту и длительность лечения определяет врач индивидуально.

Дети

При необходимости применения детям до 7 лет рекомендуется Уролесан® сироп.

Передозировка

При передозировке возможны: тошнота, рвота, боль в животе, головокружение.

Лечение: обильное теплое питье, покой, активированный уголь, атропина сульфат (0,0005-0,001 г).

Побочные реакции

Обычно Уролесан® хорошо переносится. При применении препарата возможны:

со стороны желудочно-кишечного тракта: диспептические явления (включая тошноту, рвоту, диарею, боль в животе);

со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая чувство зуда, покраснение лица, кожная сыпь, ангионевротический отек (чувство жжения во рту, затруднение дыхания, отек лица, языка), анафилактический шок;

со стороны центральной и периферической нервной системы: головокружение, общая слабость, головная боль, атаксия, мышечный тремор;

со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия, гипертензия, брадикардия.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 мл во флаконе-капельнице, по 1 флакону-капельнице в пачке;

по 25 мл во флаконе-капельнице, закрытом крышкой с контролем первого раскрытия; по 1 флакону-капельнице в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПАО «Галичфарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — Государственного реестра лекарственных средств Украины.