

Состав

действующие вещества:

2,2 мл раствора содержит: Acidum alpha-ketoglutaricum D10 – 22 мг, Acidum fumaricum D10 – 22 мг, Acidum malicum D10 – 22 мг, Acidum oroticum monohydricum D6 – 22 мг, Acidum thiocticum D8 – 22 мг, Avena sativa D6 – 22 мг, Calcium carbonicum Hahnemanni D28 – 22 мг, Chelidonium majus D5 – 22 мг, Cinchona pubescens D4 – 22 мг, Colon suis D10 – 22 мг, Cyanocobalaminum D4 – 22 мг, Cynara scolymus D6 – 22 мг, Duodenum suis D10 – 22 мг, Hepar suis D8 – 22 мг, Histaminum D10 – 22 мг, Lycopodium clavatum D4 – 22 мг, Natrium diethyloxalaceticum D10 – 22 мг, Pankreas suis D10 – 22 мг, Silybum marianum D3 – 22 мг, Sulfur D13 – 22 мг, Taraxacum officinale D4 – 22 мг, Thymus suis D10 – 22 мг, Veratrum album D4 – 22 мг, Vesica fellea suis D10 – 22 мг;

другие составляющие: натрия хлорид, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инъекций.

Основные физико-химические свойства: прозрачный и практически свободный от частей, от бесцветного до слегка розового цвета раствор без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Препарат восстанавливает дезинтоксикационную функцию печени, оказывает гепатопротекторное, желчегонное, регенерирующее, метаболическое, антиоксидантное действие, основанное на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в состав препарата.

Показания

В комплексном лечении дискинезии желчевыводящих путей, острых и хронических заболеваний печени и желчевыводящих путей, нарушений функции печени при различных соматических заболеваниях, а также в результате длительного действия различных токсических факторов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к растениям семейства сложноцветных, в т.ч. к расторопше пятнистого, одуванчика лекарственного, артишока посевного, или к другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Взаимодействие неизвестно. По назначению врача препарат можно комбинировать с другими лекарственными средствами и методами лечения.

Особенности применения

С учетом особенностей течения заболевания и состояния больного можно изменять продолжительность курса и способ применения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Случаи воздействия не известны.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат не применяют в период беременности или кормления грудью в связи с наличием в составе чистотела (*Chelidonium*) и чемерицы (*Veratrum*).

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым и детям в возрасте от 6 лет – 1 ампула по 2,2 мл, детям в возрасте от 3 до 6 лет – 1 мл. Применять 1 – 3 раза в неделю в виде внутримышечных, подкожных, а при необходимости – внутривенных (струйно) инъекций, а также в акупунктурные точки.

Курс лечения – 3 – 6 недель.

Дети

Препарат применяют детям от 3 лет.

Передозировка

Не отмечалось.

Побочные реакции

В редких случаях могут возникать реакции гиперчувствительности, в том числе кожные реакции, крапивница, гиперемия кожи; повышение температуры тела, беспокойство. В таких случаях необходимо обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Упаковка

5 (5x1) ампул по 2,2 мл в картонной коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Биология Хайльмиттель Хеель ГмбХ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).