Состав

действующее вещество: 1 г мази содержит тиотриазолин (в пересчете на 100% вещество) - 20 мг;

вспомогательные вещества: метилцеллюлоза, глицерин, метилпарабен (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), вода очищенная.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: мазь бесцветная или слегка сероватого цвета. Допускается опалесценция.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения ран и язвенных поражений. Код АТХ D03AX.

Фармакодинамика

Фармакологическое действие тиотриазолина обусловлено мембраностабилизирующими свойствами, торможением процессов перекисного окисления липидов и активацией ферментов антирадикальной защиты в поврежденных тканях кожи и слизистых оболочек, приводит к торможению развития травматического воспаления, увеличение интенсивности и скорости репаративных процессов, уменьшение сроков заживления ран.

Фармакокинетика

Тиотриазолин практически не всасывается при аппликации на коже и не поступает в системный кровоток.

Препарат достаточно быстро всасывается слизистыми полости рта, и его максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1,5 часа.

Показания

Раны, длительно незаживающих, медленно гранулируются и эпителизируются, трофические язвы и пролежни. Псориаз. Дистрофические воспалительные формы пародонтита и язвенные поражения слизистой ротовой полости и десен.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Особые меры безопасности.

Препарат применять после хирургической обработки раны, удаление некротизированных тканей и обработки поверхности раны антисептиком.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Тиотриазолин можно применять с другими противовоспалительными, антисептическими и химиотерапевтическими средствами.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказаний нет.

Способ применения и дозы

Применять наружно. Мазь наносить на поверхность раны кожи тонким слоем под повязку или открытым способом 1-2 раза в сутки в течение 1-3 недель.

При стоматологических воспалительных заболеваниях мазь вводить в десневые карманы 1-2 раза в сутки в течение 1-2 недель.

Дети

Противопоказаний нет.

Передозировка

Передозировка маловероятна.

Побочные реакции

Возможны реакции гиперчувствительности, включая зуд, сыпь, гиперемия кожи, лихорадка, крапивница, ангионевротический отек.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 г мази в тубах, по 1 тубе в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

61010, Украина, г. Харьков, ул. Гордиенковская, 1.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — Государственного реестра лекарственных средств Украины.