

Состав

действующее вещество: касторовое масло (Oleum Ricini)

1 флакон содержит 100 г рицинового масла (Oleum Ricini).

Лекарственная форма

Масло.

Основные физико-химические свойства:

Прозрачная, густая и вязкая бесцветная или немного желтоватого цвета жидкость запах слабый, вкус своеобразной, неприятный. На воздухе в тонком слое Медленно густеет, но не образует плотной или твердой пленки.

Фармакотерапевтическая группа

Слабительное средство. Код АТС А06А В05.

Фармакодинамика

При приеме внутрь гидролизуется липазой в тонком кишечнике с образованием рицинолевой кислоты, которая вызывает раздражение рецепторов кишечника и рефлекторно усиливает его перистальтику. Слабительный эффект наступает обычно через 5-6 часов. Препарат также вызывает рефлекторное сокращение миометрия.

Фармакокинетика

Фармакокинетика не определялась.

Показания

Запоры.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к препарату. Отравление жирорастворимыми веществами (фосфором, бензолом, фенолом).
- Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный колит. Отравление жирорастворимыми противогельминтными средствами,

экстрактом папоротника мужского. Острые воспалительные процессы в брюшной полости (аппендицит, перитонит). Маточные кровотечения. Кахексия. Период беременности. Пожилой возраст. Возраст до 12 лет.

- Повышенная чувствительность к растениям семейства молочайных (*Euphorbiaceae*), недиагностированный боль в области живота, обструкция желчевыводящих протоков, тяжелая дегидратация.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не рекомендуется применять Касторовое масло одновременно с экстрактом папоротника мужского.

Особенности применения

Отсутствуют.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может повредить Вашему здоровью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Данные отсутствуют.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение препарата противопоказано беременным. В период кормления грудью препарат применяют только в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для ребенка.

Способ применения и дозы

Применять внутрь.

Рекомендуемая доза для взрослых и детей старше 12 лет - 15-30 г на прием.

Если препарат применяют для очищения кишечника перед диагностическими процедурами, то целесообразно принять его за 6 часов до проведения процедуры.

Дети

Препарат применяют детям в возрасте от 12 лет.

Передозировка

Тошнота, рвота, боль в животе, диарея. Лечение симптоматическое.

Побочные реакции

Тошнота, рвота, понос, боль в животе, нарушение водно-электролитического баланса. После опорожнения кишечника возможен запор. При длительном применении - нарушение пищеварения, энтероколит, развитие привыкания, атония кишечника.

Возможны аллергические реакции.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 г во флаконе в пачке или без пачки.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

69063, Украина, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника —

Государственного реестра лекарственных средств Украины.