Состав

действующее вещество: настойка календулы (1:10) - 100 мл;

вспомогательные вещества: эмульсия консистентная: вода очищенная, парафин белый мягкий, эмульгатор "Т-2", масло минеральное.

Лекарственная форма

Мазя. Густая однородная масса светло-желтого цвета с сероватым или зеленоватым оттенком.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, способствующие заживлению ран.

Код АТС D03AX.

Фармакодинамика

Препарат оказывает противовоспалительное, репаративной и антисептическое действие. Эти эффекты обусловлены богатым содержанием веществ (каротиноиды, флованоиды, сапонины, дубильные вещества, тритерпеновые гликозиды, органические кислоты, аскорбиновая кислота), которые приводят к усилению роста грануляций, улучшения эпителизации, повышения местных защитных механизмов.

Показания

Ожоги, порезы, трещины и другие поражения кожи.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Надлежащие меры безопасности при применении. Не следует применять лицам, склонным к аллергическим реакциям на препараты календулы. Избегать попадания мази в глаза. В случае случайного попадания мази в глаза необходимо промыть их водой и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не установлена.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не рекомендуется применять Календулы мазь в период беременности или кормления грудью.

Способ применения и дозы

Препарат применяют наружно. Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки (можно применять под окклюзионную повязку). Продолжительность курса лечения определяется врачом индивидуально и зависит от характера и выраженности патологического процесса, достигнутого эффекта.

Дети

Безопасность и эффективность применения мази детям до 12 лет не установлены, поэтому назначать препарат этой категории пациентов можно только после тщательной оценки соотношения риск/польза (по назначению врача).

Передозировка

Не обнаружено. Возможно усиление проявлений побочных реакций.

Побочные реакции

При индивидуальной повышенной чувствительности могут наблюдаться аллергические реакции, включая покраснение кожи, сыпь, зуд, ангионевротический отек.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 г в тубе.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АО «Лубныфарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Барвинкова, 16.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — Государственного реестра лекарственных средств Украины.