

## **Состав**

*действующее вещество:* настойка календулы (1:10) - 100 мл;

*вспомогательные вещества:* эмульсия консистентная: вода очищенная, парафин белый мягкий, эмульгатор "Т-2", масло минеральное.

## **Лекарственная форма**

Мазя. Густая однородная масса светло-желтого цвета с сероватым или зеленоватым оттенком.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Препараты, способствующие заживлению ран.

Код АТС D03AX.

## **Фармакодинамика**

Препарат оказывает противовоспалительное, репаративной и антисептическое действие. Эти эффекты обусловлены богатым содержанием веществ (каротиноиды, флавоноиды, сапонины, дубильные вещества, тритерпеновые гликозиды, органические кислоты, аскорбиновая кислота), которые приводят к усилению роста грануляций, улучшения эпителизации, повышения местных защитных механизмов.

## **Показания**

Ожоги, порезы, трещины и другие поражения кожи.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

*Надлежащие меры безопасности при применении.* Не следует применять лицам, склонным к аллергическим реакциям на препараты календулы. Избегать попадания мази в глаза. В случае случайного попадания мази в глаза необходимо промыть их водой и обратиться к врачу.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не установлена.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Не рекомендуется применять Календулы мазь в период беременности или кормления грудью.

### **Способ применения и дозы**

Препарат применяют наружно. Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки (можно применять под окклюзионную повязку). Продолжительность курса лечения определяется врачом индивидуально и зависит от характера и выраженности патологического процесса, достигнутого эффекта.

### **Дети**

Безопасность и эффективность применения мази детям до 12 лет не установлены, поэтому назначать препарат этой категории пациентов можно только после тщательной оценки соотношения риск/польза (по назначению врача).

### **Передозировка**

Не обнаружено. Возможно усиление проявлений побочных реакций.

### **Побочные реакции**

При индивидуальной повышенной чувствительности могут наблюдаться аллергические реакции, включая покраснение кожи, сыпь, зуд, ангионевротический отек.

### **Срок годности**

2 года.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Упаковка**

По 30 г в тубе.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

АО «Лубныфарм».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Барвинкова, 16.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).