

Состав

1 флакон содержит:

действующие вещества: экстракт жидкий (1: 1) из лекарственного растительного сырья: ромашки цветков (flores chamomile), календулы цветков (flores calendulae), тысячелистника (herba millefolii) (2: 1: 1) - 55 мл;

вспомогательные вещества: этанол (96%), вода очищенная.

Лекарственная форма

Экстракт жидкий.

Основные физико-химические свойства: жидкость темно-коричневого цвета с оранжевым оттенком, со специфическим запахом. При хранении допускается образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм. Препараты, применяемые в стоматологии. Код АТХ А01А D11.

Фармакодинамика

Комбинированный растительный препарат, действие которого обусловлено физиологически активными веществами, которые входят в его состав, оказывают противовоспалительное, противомикробное и спазмолитическое действие, а также снижают проницаемость капилляров, усиливают и ускоряют процессы регенерации слизистых оболочек (улучшают трофические процессы) и имеют умеренные гемостатические свойства.

Препарат положительно влияет на трофику слизистой оболочки желудка, оказывает спазмолитическое действие.

Ротокан оказывает ранозаживляющее и антиоксидантное действие.

Показания

В стоматологической практике при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта (афтозный и другие стоматиты, язвенно-некротический гингивостоматит).

В составе комбинированной терапии при лечении заболеваний органов пищеварения (хронических гастрит, дуоденит, функциональной диспепсии, хронических колитов).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

При пероральном применении - повышенная свертываемость крови, склонность к тромбообразованию.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна. В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Особенности применения

Без консультации врача не применять препарат дольше установленного срока. Если признаки заболевания не начнут исчезать или же наоборот - состояние здоровья ухудшилось, появились нежелательные явления, нужно обратиться к врачу за консультацией относительно дальнейшего применения препарата.

При применении - не превышать рекомендованные дозы.

При язвенной болезни и гастрите с повышенной кислотностью применять вместе с антацидами и спазмолитиками.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не исследовались.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью препарат применять только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Перед применением взрослым и детям старше 12 лет 1 чайную ложку (5 мл) Ротокана растворить в 1 стакане теплой воды.

Пародонтоз лечить местно после удаления зубных отложений и инструментальной обработки патологических десневых карманов. В десневые карманы вводить на 20 минут тонкие турунды, хорошо смоченные приготовленным раствором препарата. Процедуру следует проводить ежедневно или через день (4-6 раз).

При стоматитах и других заболеваниях слизистой оболочки полости рта препарат назначать в виде аппликаций из приготовленного раствора препарата продолжительностью 15-20 минут ротовых ванночек из такого же раствора продолжительностью 1-2 минуты. Применяют 2-3 раза в сутки в течение 2-5 дней.

В гастроэнтерологии Ротокан принимать внутрь и применять в микроклизмах.

Внутрь применять по 1 / 2-1 / 3 стакана раствора из расчета 1 чайная ложка Ротокана на 1 стакан теплой кипяченой воды за 30 минут до еды или через 40-60 минут после еды 3-4 раза в сутки.

Для микроклизм: 1 чайная ложка препарата на 50-100 мл теплой кипяченой воды (после очищения кишечника) 1-2 раза в сутки. Курс лечения составляет 15-20 дней. Продолжительность применения препарата зависит от достигнутого терапевтического эффекта и течения заболевания.

Дети

Детям до 12 лет препарат не применять.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны.

Возможно усиление побочных реакций.

При пероральном применении передозировка сопровождается острым алкогольным отравлением, симптомы которого аналогичны симптомам отравления этиловым спиртом.

Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.

Побочные реакции

У лиц с повышенной чувствительностью возможны аллергические реакции, отек кожи, покраснение кожи, сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек, анафилактический шок.

В случае возникновения любых негативных реакций следует прекратить применение Ротокана и обратиться к врачу относительно дальнейшего его применения.

Срок годности

3 роки.

Упаковка

По 55 мл у флаконах № 1.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АТ «Лубнифарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).