

Состав

Спиртовой раствор модификации фенолоформальдегидной смолы, поливинилбутироля и канифоли, пластифицированный пластификатором.

Лекарственная форма

Клей медицинский БФ-6. Средство для заживления ран.

Фармакологические свойства

Клей медицинский БФ-6 оказывает ранозаживляющее и антисептическое действие. Используется как изолирующее средство, способствует заживлению мелких кожных ран вследствие образования на их поверхности изолирующей пленки.

Последняя эластична и устойчива к механическим и химическим воздействиям.

При покрытии Клеем БФ-6 корня зуба создаются условия изоляции микрофлоры мелких корневых канальцев от продуктов деструкции тканей.

Показания

Данное средство используется:

- для обработки ссадин, царапин, порезов;
- для дезинфекции раздражений на коже;
- в стоматологии клей используется для покрытия корня зуба, лечения околокорневого зубного очага (гранулем, кист и прочего).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы

Клей БФ-6 применяют местно для взрослых и детей. Детям в возрасте до 1 года применения Клея БФ-6 не рекомендуется.

Перед нанесением препарата участок кожи тщательно очищают от загрязнений.

Ватным или марлевым тампоном останавливают кровотечение и просушивают место, которое подлежит покрытию клеем. Последний наносят на кожу тонким равномерным слоем до полного покрытия участка повреждения и прилегающих неповрежденных тканей. В случае нарушения целостности пленки поверх нее наносят новую пленку.

При хирургическом лечении околокорневых очагов инфекции корень зуба тщательно очищают от грануляции и оболочки кисты, останавливают кровотечение, просушивают и покрывают клеем часть корня зуба, которая выступает в дефект костной ткани челюсти, не допуская затекания клея на кость. Через 1-2 минуты рану осушают, следя за заполнением околокорневого дефекта челюсти кровью пьяным сгустком. Дальнейшее ведение послеоперационного периода обычное.

Пленка образуется в течение 2-5 минут после нанесения клея БФ-6 и прочно удерживается на коже в течение 2-3 дней, а на верхушке корня зуба до 7 суток.

Дети

Применять детям от 1 года.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции.

Срок годности

4 года от даты производства.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C, вдали от нагревательных устройств и открытого огня.

Хранить в недоступном для детей месте! Не использовать после истечения указанного срока годности.

Упаковка

По 25 г во флаконе.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО "Лубныфарм" (Украина).

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

37500, Украина, Полтавская обл., Г. Лубны, ул. Барвинковая, 16.