

Состав

действующие вещества: 100 г сиропа содержит сложный жидкий экстракт (1:2) с: травы тысячелистника (*Achillea millefolium* L. herba), травы шандры обычной (*Marrubium vulgare* L. herba), листья Melissa (*Melissae officinalis* L. folium), плодов фенхеля (*Foeniculum vulgare* Mill., fructus) (3/2/3/2), экстрагент - вода очищенная - 15,0 г;

вспомогательные вещества: концентрат апельсиновый, натрия бензоат, сахароза, вода очищенная.

Лекарственная форма

Сироп.

Основные физико-химические свойства: жидкость чайного цвета со сладко-горьким вкусом и своеобразным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Стимуляторы аппетита. Код АТХ А15.

Фармакодинамика

В состав сиропа входит экстракт лекарственных трав, содержащих горечи (трава шандры, листья Melissa, трава тысячелистника) и плодов фенхеля, которые усиливают секрецию желудочного сока рефлекторным путем. Препарат этого типа обычно применяют при отсутствии аппетита.

Показания

Сироп Апетистим применяется при отсутствии аппетита.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к вспомогательному веществу или к растениям семейства сложноцветных (*Asteraceae*).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Данных нет.

Особенности применения

Если симптомы усилятся или не прекратятся после 10 дней, следует рассмотреть вопрос об изменении лечения.

Пациенты с редкими генетическими расстройствами, связанными с непереносимостью фруктозы, синдромом нарушения всасывания глюкозы / галактозы или недостаточностью сахарозы-изомальтазы, не должны принимать препарат.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Лекарственный препарат Апетистим не влияет на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Из-за отсутствия достаточных данных не следует применять сироп в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Сироп принимают внутрь, примерно за полчаса до еды.

К упаковке прилагается мерный стаканчик, который облегчает дозировку.

Дети в возрасте от 3 до 6 лет - по 2,5 мл 2 раза в день (мерным стаканчиком или ½ чайной ложки), дети в возрасте от 6 до 18 лет - по 5 мл 2-3 раза в день (мерным стаканчиком или 1 чайная ложка).

Взрослые - по 15 мл 3-4 раза в день (мерным стаканчиком или 1 столовая ложка).

Дети

При применении детям дозу сиропа следует разбавить в небольшом количестве слабого чая.

Передозировка

Не описано случаев передозировки.

Побочные реакции

Побочные реакции представлены по системно-органной классификации MedDRA и частотой появления: очень часто ($\geq 1 / 10$); часто ($\geq 1 / 100$ до $< 1/10$), не слишком часто ($\geq 1 / 1000$ до $< 1/100$), редко ($\geq 1 / 10\ 000$ до $< 1/1000$); очень редко ($< 1/10000$), частота неизвестна (невозможно ее определить на основании доступных данных).

Со стороны кожи и подкожной ткани (аллергические кожные реакции) - частота неизвестна.

Расстройства дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения (аллергические реакции со стороны дыхательной системы) - частота неизвестна.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° C, в недоступном для детей месте.

Упаковка

Флакон из цветного стекла, содержащий 125 г сиропа, с колпачком HDPE, с мерным стаканчиком в коробке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Вроцлавское предприятие лекарственных трав «Гербаполь» АО.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

ул. Св. Николая 65/68, 50-951 Вроцлав, Польша.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).