

Состав

Метилсалицилат 5,7%, левоментол 5,7%, камфора 1,2%, токоферола ацетат 2,0%.

Вспомогательные компоненты: акрил насыщенная углеводородная смола, жидкие парафин, полиизобутилен, потизобутилен 1200000, блок-сополимеры бутадиена и стирола, синтетические ситкат алюминия, тканевая подкладка и защитная бумага.

Рекомендации по применению

Для симптоматического облегчения острой и хронической боли, связанной с воспалением сухожилий, связок, мышц и суставов травматического происхождения, при растяжениях связок и сухожилий, вывихах, синяках, боли в суставах, спине, шее и пояснице у взрослых и детей от 12 лет.

Способ применения

Только для внешнего применения.

Очистить и просушить пораженный участок и наложить пластырь, предварительно освободив от защитной бумаги.

Время использования одного пластыря обычно составляет 8-12 часов. В течение суток на болезненной участок допускается применение не более 2-х пластырей.

При необходимости можно разрезать пластырь и его части, что соответствует по размеру площади пораженного участка.

Схема нанесения

1. Согнуть пластырь посередине и освободить часть поверхности от защитного паперу.
2. Приклеить пластырь к болезненному участку кожи и вытянуть часть защитной бумаги с под пластыря.
3. Разгладить.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активным составляющим пластыря, к нестероидным противовоспалительным лекарственным средствам (НПВС), аллергия на аспирин или салицилаты.

Активные составляющие не попадают в системный кровоток, но не рекомендуется применять при язве желудка или 2-перстной кишки, при желудочно-кишечных кровотечениях, при бронхиальной астме в анамнезе, при сердечной недостаточности, тяжелых формах печеночных и почечной недостаточности, беременным женщинам и женщинам в период лактации, детям и подросткам до 12 лет.

Не допускать контакта поверхности пластыря с глазами, слизистыми оболочками.

Также не применять на открытых ранах или участках кожи с патологическими изменениями, такими как экзема, акне, дерматиты, воспаления или инфекции различного происхождения.

Предостережение

Средство не назначено для применения внутрь.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Запрещается использовать одновременно с грелкой.

В случае случайного проглатывания немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Прекратить использование пластыря и обратиться к врачу следует:

- в случае ухудшения состояния кожи (появление сыпи, зуда или сильное раздражение кожи).
- при сохранении болевых симптомов в течение 3 дней или повторном проявлении симптомов после непродолжительного улучшения состояния.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С, в защищенном от света и недоступном для детей месте.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

После вскрытия саше использовать в течение месяца.

Срок годности 3 года.

Форма выпуска

По 1, 2, 5 или 10 пластырей размером 10 см (см) x 12 см (см), в саше, по 1, 2 или 5 саше в картонной коробке.