

## **Состав**

*действующее вещество:* декспантенол;

1 г крема содержит декспантенол в пересчете на 100% вещество 50 мг;

*вспомогательные вещества:* феноксиэтанол, DL-пантолактон, керамиды, натрия цетостеарил-сульфат, спирт цетостеариловый, натрия полиакрилат, пропиленгликоль, ланолин, изо-пропилмиристат, диметикон, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Крем.

*Основные физико-химические свойства:* крем белого или белого с чуть желтоватым оттенком цвета.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства для лечения ран и язвенных поражений. Препараты, способствующие заживлению ран. Другие препараты, способствующие заживлению.

Декспантенол.

Код АТХ D03A X03.

## **Фармакодинамика**

Действующим веществом препарата является декспантенол – провитамин В5. В клетках кожи декспантенол быстро превращается в пантотеновую кислоту и действует как витамин. Декспантенол быстрее пантотеновой кислоты абсорбируется после наружного применения.

Пантотеновая кислота является компонентом коэнзима А (СОА). В этой форме ацетилкоэнзим А (СоА) играет центральную роль в метаболизме каждой клетки. Пантотеновая кислота является таким образом необходимой для формирования и заживления поврежденных кожи и слизистых.

## **Фармакокинетика**

Декспантенол при наружном применении быстро абсорбируется кожей. В клетках кожи декспантенол сразу превращается в пантотеновую кислоту и добавляется в эндогенный фонд этого витамина.

В крови пантотеновая кислота связывается с  $\beta$ -глобулином и альбуминами

плазмы. У здоровых взрослых концентрация составляет примерно 500-1000 мг/л и 100 мг/л в крови и сыворотке соответственно.

Пантотеновая кислота не подвергается биотрансформации. Она удаляется неизменной. 60-70% выводится с мочой, остальные – с фекалиями. У взрослых выделяется с мочой 2-7 мг пантотеновой кислоты в сутки, у детей – 2-3 мг.

## **Показания**

Пантекрем® , крем, применять в следующих случаях:

- профилактическая обработка сухой, покрасневшей кожи или кожи с трещинами;
- ускорение заживления и эпителизации кожи при микроповреждении (незначительные ожоги и царапины); при раздражении кожи (которые являются следствием радиотерапии, фототерапии или облучения ультрафиолетовым светом); пеленочном дерматите; при хронических язвах кожи и пролежнях; анальных трещинах; эрозии шейки матки и после пересадки кожи;
- обработка кожи пациентов во время и после местного применения кортикостероидов;
- профилактический уход за молочными железами у кормящих грудью женщин и для лечения раздражений и трещин сосков.

## **Противопоказания**

Установлена повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Случаи взаимодействия с другими препаратами неизвестны.

## **Особенности применения**

Препарат имеет гидрофильную кремовую основу, в результате чего он быстро всасывается кожей, поэтому пригоден для обработки мокнущих ран, незащищенных участков кожи (например, кожи лица) и участков кожи, покрытых волосами.

При применении препарата следует избегать контакта с глазами.

Спирт цетостеариловый, ланолин могут вызывать кожные реакции (например, контактный дерматит). Пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Нет никаких доказательств, что применение препарата в период беременности или кормления грудью может привести к риску.

В период беременности препарат следует применять по назначению врача. При применении для лечения сосков трещин в течение кормления грудью препарат следует смывать перед кормлением.

### **Способ применения и дозы**

*Ускорение заживления и эпителизации, регулярная профилактическая обработка кожи:* препарат применять 1 или несколько раз в сутки в зависимости от необходимости.

*Наблюдение за грудными железами у кормящих грудью:* наносить крем на соски после каждого кормления грудью.

*Лечение дефектов слизистой шейки матки:* крем применять 1 или несколько раз в сутки, в зависимости от необходимости.

*Профилактическое наблюдение за младенцами:* крем применять при каждой смене пеленок (подгузник).

Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально в зависимости от наличия клинических признаков повреждений кожи.

Крем быстро проникает в кожу, пригодный для ухода за мокнущими ранами, незащищенными поверхностями кожи (лица) и волосистой кожей. Он легко распределяется по поверхности, поэтому пригоден для лечения болезненных солнечных и других тяжелых ожогов.

### **Дети**

Препарат применять детям разных возрастов, включая младенцев.

## **Передозировка**

Сообщения о случайной передозировке отсутствуют.

Действующее вещество крема, декспантенол хорошо переносится и, таким образом, в литературе рассматривается как нетоксичное.

Гипервитаминоз не описан.

## **Побочные реакции**

*Со стороны иммунной системы, а также кожи и подкожных тканей.*

Сообщалось об аллергических реакциях, в том числе со стороны кожи: контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, эритема, экзема, сыпь, крапивница, раздражение кожи и пузырьки.

## **Срок годности**

3 года.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте. Не замораживайте.

## **Упаковка**

По 30 г в тубах; 1 туба в пачке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

ЧАО «ФИТОФАРМ».

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 84500, Донецкая область, г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).