Состав

действующие вещества: ментол, новокаин (прокаина гидрохлорид), анестезин (бензокаин);

100 мл раствора содержит ментола рацемического – 2,5 г, прокаина гидрохлорида – 1 г, бензокаина– 1 г;

вспомогательные вещества: этанол 70%.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения, спиртовой.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость с запахом ментола

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли.

Код АТХ М02А Х.

Фармакодинамика

Препарат обладает противозудным действием и местноанестезирующий эффект. При нанесении на кожу и слизистые оболочки вызывает раздражение нервных окончаний, сопровождающееся ощущением холода, легкого жжения и покалывания.

Оказывает легкое обезболивающее действие.

Фармакокинетика

При местном применении препарат не поступает в кровяное русло.

Показания

Лекарственное средство назначают при невралгиях, миалгия, артралгия.

Противопоказания

Препарат противопоказан при повышенной чувствительности к новокаину и другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Компоненты препарата (новокаин, анестезин) ослабляют антибактериальное действие сульфаниламидных препаратов, усиливают эффекты препаратов с местноанестезирующим действием.

При одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.

Особенности применения

Не наносить на поврежденную кожу и кожу с проявлениями аллергии. Не наносить на кожу лица.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства это может повредить здоровью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью применение препарата возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Лекарственное средство применяют наружно. Болезненные участки кожи растирают раствором Меновазин-Вишфа 2-3 раза в сутки. Курс лечения зависит от формы, тяжести заболевания, эффекта препарата, а также от характера лечения (монотерапия или применения в комплексе с другими лекарственными средствами).

Дети

Не назначают детям в возрасте до 12 лет.

Передозировка

При длительном применении возможны головокружение, общая слабость, снижение артериального давления, аллергические реакции. При появлении таких симптомов препарат следует отменить, остатки смыть с поверхности кожи водой, провести симптоматическую терапию.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции (гиперемия, раздражение кожи, зуд, сыпь, отек, крапивница).

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности

3 года.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 40 мл во флаконах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ГКП« Фармацевтическая фабрика ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — Государственного реестра лекарственных средств Украины.