

Состав

действующие вещества: glucosamine, ibuprofen, allantoin;

1 г препарата содержит глюкозамина гидрохлорид 30 мг, ибупрофена 30 мг, алантоина 10 мг;

вспомогательные вещества: глицерин моностеарат, масло минеральное, изопропилмиристат, спирт цетостеариловый, полиэтиленгликоля стеарат, полисорбат 80, этанол 96%, метилпарабен (Е 218), пропилпарабен (Е 216), ментол, метилпиролидинон, натрия метабисульфит (Е 223), вода очищенная.

Лекарственная форма

Крем.

Основные физико-химические свойства: крем белого цвета, однородной консистенции со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при патологии опорно-двигательного аппарата. Код АТХ М09А Х.

Фармакодинамика

Комбинированный трехкомпонентный препарат для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. В его состав входят глюкозамина гидрохлорид, ибупрофен и аллантоин.

Благодаря комбинированному составу препарат оказывает хондропротекторный, анальгетический, противовоспалительный, антиэкссудативный, мембранопротекторный и антиоксидантный эффекты.

Глюкозамина гидрохлорид - низкомолекулярный мукополисахарид, который стимулирует регенерацию суставной сумки и хрящевой ткани сустава, а также тормозит процессы разрушения хрящевой ткани. Улучшает синтез внутрисуставной жидкости, которая выполняет роль смазки, улучшая скольжение сустава. Глюкозамина гидрохлорид повышает резистентность хондроцитов к действию противовоспалительных цитокининов и активирует метаболические процессы в матриксе сустава, тем самым способствует формированию устойчивого сустава. Повышает эластичность и сопротивление сжатию хряща, которые необходимы для противодействия физической нагрузке.

Глюкозамина гидрохлорид имеет умеренный противовоспалительный эффект, поэтому усиливает действие ибупрофена.

Ибупрофен оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие.

Анальгезирующее действие ибупрофена связана со снижением интенсивности воспаления, уменьшением выработки и ослаблением специфических медиаторов боли (аналгогенив брадикинина). Ослабляет болевой синдром, в т. ч. артралгию в покое и при движении, снижает утреннюю скованность и припухлость сустава, способствует увеличению объема движений.

Аллантоин - растительный препарат окопника лекарственного.

Обладает противовоспалительными свойствами, уменьшает болевые ощущения, стимулирует процессы регенерации костной ткани.

Метилпиролидинон является трансдермальной веществе, которое способствует проникновению действующих веществ крема через кожу в ткани сустава.

Фармакокинетика

Не исследовалась.

Показания

Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, сопровождающиеся признаками воспаления, отеком и болью, дегенеративно-дистрофическими изменениями хрящевой ткани суставов и позвоночника, снижением подвижности суставов (остеоартроз, артропатии, межпозвонковый остеохондроз).

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- дерматозы, мокнущая экзема;
- астма и если НПВС могут вызвать приступ астмы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не установлено негативной лекарственного взаимодействия при назначении комбинированного препарата - крема с ибупрофеном - с другими лекарственными средствами, включенными в общепринятые схемы лечения.

Кофеин усиливает анальгезирующий эффект ибупрофена. Ибупрофен может снижать диуретический эффект фуросемида. При применении с ацетилсалициловой кислотой или другими НПВП повышается риск появления побочных эффектов. Глюкозамин проявляет синергическое действие в хондроитина и других хондропротекторов.

Особенности применения

Не наносить крем на открытые раны, не допускать попадания на слизистые оболочки.

С осторожностью применять при сопутствующих заболеваниях почек.

Не следует превышать рекомендуемую дозу и продолжительность лечения. При длительном применении возможно развитие побочных эффектов ибупрофена.

Препарат содержит спирт цетостеариловый, который может привести к местным кожным реакциям (например контактный дерматит); метилпарабен (Е 218) и пропилпарабен (Е 216), которые могут вызвать аллергические реакции (возможно замедленные).

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять автомобилем и работать с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Опыта применения препарата в период беременности и кормления грудью нет, поэтому не рекомендуется применение лекарственного средства в эти периоды.

Способ применения и дозы

Крем наносить 2-3 раза / сут на кожу в очаг воспаления и втирать в течение 2-3 минут. Курс лечения - 2 недели.

Дети

Применять детям в возрасте от 12 лет.

Передозировка

Данных нет.

Побочные реакции

В результате проведения клинических испытаний существенных побочных эффектов не обнаружено, но есть вероятность побочного действия препарата, содержащего ибупрофен, со стороны кожи, пищеварительного тракта, мочевыделительной системы.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Крем по 40 г в тубах в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания» Здоровье ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 61013, Харьковская обл., Город Харьков, улица Шевченко, дом 22

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).