

## **Состав**

*действующие вещества:* гексетидин, холина салицилат, хлорбутанола гемигидрат;

1 мл препарата содержит гексетидина 1 мг холина салицилата 5 мг хлорбутанола гемигидрата в пересчете на хлорбутанол 2,5 мг;

*вспомогательные вещества:* сахарин натрия, полисорбат, кислота пропионовая, этанол 96%, масло лимонное, масло анисовое, ментол, масло мяты перечной, эвкалиптол, метилсалицилат, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Спрей для полости рта.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачный, слегка окрашенный раствор со специфическим приятным запахом.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики. Код АТХ R02A A20.

## **Фармакодинамика**

Действие препарата обусловлено тремя активными ингредиентами.

Антибактериальная и противогрибковая активность. Гексетидин имеет антибактериальное воздействие как на грамположительные, так и на грамотрицательные штаммы микроорганизмов, как на аэробные, так и на анаэробы.

Следует отметить, что на аэробные штаммы он имеет в основном бактериостатическое влияние, бактерицидное действие - слабая. На анаэробные штаммы гексетидин имеет выраженное бактерицидное действие. Механизм действия заключается в конкурентной взаимодействии с тиамин: структура гексетидина похожа на структуру тиамина, необходимого для роста микроорганизмов.

Противовоспалительная активность. Холина салицилат оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Для лечения заболеваний ротовой полости.

Обезболивающее активностью обеспечивается хлорбутанолом. Применять в отоларингологии (капли в нос, полоскания) и в стоматологической практике (аппликации и орошения) как анестетик.

### **Фармакокинетика**

Активные вещества фиксируются на слизистой оболочке ротовой полости, откуда они постепенно высвобождаются.

### **Показания**

Антибактериальный и обезболивающее средство для местного лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта и ротоглотки.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Противопоказано пациентам с атрофическим фарингитом, бронхиальной астмой или с любыми другими заболеваниями дыхательных путей, связанными с имеющейся гиперчувствительностью дыхательных путей.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не применять вместе с препаратами, содержащими антисептики. Гексетидин может быть инактивированный щелочными растворами.

### **Особенности применения**

При применении препарат не глотать и избегать контакта с глазами, поскольку он содержит этанол. Не рекомендуется длительное применение, поскольку может измениться природный микробный баланс полости рта и горла, где есть риск бактериального и грибкового распространения. При появлении общих клинических признаков бактериальной инфекции следует назначить общую антибактериальную терапию. Если симптомы сохраняются более 5 дней и/или повышенная температура тела, необходимо пересмотреть тактику лечения.

Препарат следует с осторожностью применять пациентам с эпилепсией.

Препарат может уменьшать эпилептический порог и вызывать судороги у детей. Осторожно применять пациентам со склонностью к аллергическим реакциям, включая бронхиальную астму, особенно у пациентов с аллергией к ацетилсалициловой кислоте. При появлении признаков гиперчувствительности к

препарату его использования следует немедленно прекратить. Препарат содержит этанол, поэтому его следует с осторожностью назначать пациентам с заболеванием печени. Есть риск возникновения ларингоспазма у детей в связи с наличием ментола.

При усилении воспаления лечения следует прекратить.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат содержит этанол. Водителям не рекомендуется управлять автомобилем в течение 30 минут после применения препарата.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Данные исследований у людей о возможности проникновения через плаценту и экскреции в грудное молоко гексетидина отсутствуют, поэтому препарат не следует применять в период беременности и кормления грудью.

### **Способ применения и дозы**

Применять как местное средство для орошения ротовой полости и ротоглотки.

*Взрослым и детям старше 15 лет:* 1 распыление 4-6 раз в сутки.

*Детям в возрасте от 6 до 15 лет:* 1 распыление 2-3 раза в сутки.

Курс лечения - не более 5 дней.

### **Дети**

Не следует применять препарат детям в возрасте до 6 лет.

### **Передозировка**

Сообщений о передозировке препарата не поступало.

Через всасывания достаточного количества раствора в ротовой полости может возникнуть алкогольная интоксикация из-за содержания этилового спирта.

Концентрация гексетидина в препарате не является токсичной, если препарат использовать по назначению.

Возникновение острой алкогольной интоксикации маловероятно. Если ребенок проглотил большую дозу препарата, может возникнуть алкогольная

интоксикация из-за содержания этилового спирта.

Не отмечалось случаев чрезмерного применения гексетидина, что приводило к возникновению аллергических реакций.

Лечение передозировки является симптоматическим, но редко является необходимым. В случае проглатывания ребенком содержимого флакона следует немедленно обратиться к врачу. Необходимо рассмотреть возможность проведения промывания желудка в течение 2 часов после глотания и принять меры по устранению признаков алкогольной интоксикации.

### **Побочные реакции**

*Со стороны иммунной системы:* реакции гиперчувствительности, включая крапивницу, ангионевротический отек, аллергические реакции, включая ларингоспазм, бронхоспазм.

*Со стороны нервной системы:* нарушение вкуса (в т. ч. агевзия, дисгевзия), изменение вкусовых ощущений в течение 48 часов (ощущение «сладкого» может дважды меняться на ощущение «горького»).

*Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения:* кашель, одышка.

*Со стороны пищеварительной системы:* сухость во рту, дисфагия, увеличение слюнных желез, боль при глотании. При случайном проглатывании препарата могут возникнуть желудочно-кишечные расстройства, прежде всего тошнота и рвота.

*Со стороны кожи и подкожной клетчатки:* аллергический контактный дерматит, кожные реакции (сыпь).

*Общие нарушения и состояние места применения:* местные реакции, включая обратную изменение цвета зубов и языка; чувствительность слизистой оболочки, а именно - жжение, чувство онемения; раздражение (болезненность, ощущение жара, зуд) языка и/или слизистой оболочки ротовой полости; снижение чувствительности; парестезии слизистой оболочки; воспаления; пузырьки; возникновения язв на слизистой оболочке ощущение першения в горле, отек в месте контакта, сухость слизистой оболочки носа/горла.

### **Срок годности**

3 года.

**Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

**Упаковка**

По 30 мл в баллоне с насадкой-распылителем и защитным колпачком в коробке.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

Общество с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая компания" Здоровье".

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).