

Состав

действующие вещества: йод, калия йодид, глицерин;

1 г раствора содержит йода - 0,01 г, калия йодида - 0,02 г, глицерина в пересчете на 100% - 0,83 г;

вспомогательные вещества: вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор для ротовой полости.

Основные физико-химические свойства: прозрачная сиропообразная жидкость красно-бурого цвета с запахом йода.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики.

Код АТХ R02A A20.

Фармакодинамика

Люголя раствор с глицерином оказывает бактерицидное действие за счет содержания в нем свободного йода. Препарат оказывает противомикробное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе на стрептококки, стафилококки, кишечную палочку, клебсиеллы, вульгарный протей.

Показания

Воспалительные заболевания слизистых оболочек глотки и гортани: тонзиллит, фарингит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Тяжелые заболевания печени и почек, выраженная гиперфункция щитовидной железы, декомпенсированная сердечная, почечная или печеночная недостаточность исследования или терапия радиоактивным йодом (за 2 недели до и после исследования или терапии).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не применять одновременно с раствором перекиси водорода и другими дезинфицирующими средствами.

Особенности применения

Препарат предназначен для приема внутрь. Не следует вдыхать и / или проглатывать препарат. Не допускать попадания препарата в глаза. С осторожностью применять при ларингите из-за возможности ларингоспазма, при туберкулезе, геморрагических диатезах.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства - это может повредить здоровью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат противопоказан в период беременности или кормления грудью.

Способ применения и дозы

Для наружного применения

Тампоном, смоченным препаратом, смазывать пораженные слизистые оболочки глотки и гортани 3-4 раза в день.

Продолжительность лечения зависит от течения заболевания и его тяжести.

Пациент должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства или наблюдаются побочные реакции, не указанные в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства.

Дети

Не рекомендуется применять детям до 5 лет.

Передозировка

Возможны проявления йодизма: насморк, крапивница, отек Квинке, слезотечение, слюноотечение, сыпь на коже, мышечная слабость, заторможенность.

Лечение. Немедленное прекращение применения препарата и симптоматическая терапия.

Побочные реакции

При длительном застосуванні могут появиться явления йодизма (насморк, крапивница, отек Квинке, слезотечение, слюноотечение, сыпь на коже, мышечная слабость, заторможенность).

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 г во флаконах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПрАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., Г.. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).