

## **Состав**

*действующие вещества:* йод, калия йодид, глицерин;

1 г раствора содержит йода - 0,01 г, калия йодида - 0,02 г, глицерина в пересчете на 100% - 0,83 г;

*вспомогательные вещества:* вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Раствор для ротовой полости.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная сиропообразная жидкость красно-бурого цвета с запахом йода.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики.

Код АТХ R02A A20.

## **Фармакодинамика**

Люголя раствор с глицерином оказывает бактерицидное действие за счет содержания в нем свободного йода. Препарат оказывает противомикробное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе на стрептококки, стафилококки, кишечную палочку, клебсиеллы, вульгарный протей.

## **Показания**

Воспалительные заболевания слизистых оболочек глотки и гортани: тонзиллит, фарингит.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Тяжелые заболевания печени и почек, выраженная гиперфункция щитовидной железы, декомпенсированная сердечная, почечная или печеночная недостаточность исследования или терапия радиоактивным йодом (за 2 недели до и после исследования или терапии).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не применять одновременно с раствором перекиси водорода и другими дезинфицирующими средствами.

## **Особенности применения**

Препарат предназначен для приема внутрь. Не следует вдыхать и / или проглатывать препарат. Не допускать попадания препарата в глаза. С осторожностью применять при ларингите из-за возможности ларингоспазма, при туберкулезе, геморрагических диатезах.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства - это может повредить здоровью.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Препарат противопоказан в период беременности или кормления грудью.

## **Способ применения и дозы**

Для наружного применения

Тампоном, смоченным препаратом, смазывать пораженные слизистые оболочки глотки и гортани 3-4 раза в день.

Продолжительность лечения зависит от течения заболевания и его тяжести.

*Пациент должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства или наблюдаются побочные реакции, не указанные в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства.*

## **Дети**

Не рекомендуется применять детям до 5 лет.

## **Передозировка**

Возможны проявления йодизма: насморк, крапивница, отек Квинке, слезотечение, слюноотечение, сыпь на коже, мышечная слабость, заторможенность.

*Лечение.* Немедленное прекращение применения препарата и симптоматическая терапия.

### **Побочные реакции**

При длительном застосуванні могут появиться явления йодизма (насморк, крапивница, отек Квинке, слезотечение, слюноотечение, сыпь на коже, мышечная слабость, заторможенность).

### **Срок годности**

3 года.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 25 г во флаконах.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ПрАО «ФИТОФАРМ».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 84500, Донецкая обл., Г.. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).