

Состав

действующие вещества: 1 г сбора содержит бессмертника песчаного цветков (*Helichrysi arenarii flores*) 0,4 г, тысячелистника травы (*Millefolii herba*) 0,2 г, мяты перечной листья (*Menthae piperitae folia*) 0,2 г, кориандра плодов (*Coriandri fructus*) 0,2 г;

Лекарственная форма

Сбор.

Основные физико-химические свойства: смесь неоднородных кусочков серовато-зеленого цвета с вкраплениями желтого, оранжевого и желтовато-бурого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при билиарной патологии. Код АТХ А05А Х.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества препарата увеличивают секрецию желчи, оказывают желчегонное, спазмолитическое, противовоспалительное действие.

Показания

Хронические холециститы, холангиты, ангиохолиты с гипомоторной дискинезией желчного пузыря (в составе комплексной терапии).

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата (в т.ч. к растениям семейства Астровых (Сложноцветные). Обтурационная желтуха или желчекаменная болезнь с наличием конкрементов размером больше 10 мм в диаметре; острые воспалительные заболевания печени, желчного пузыря и поджелудочной железы; бронхиальная астма; повышенная свертываемость крови, склонность к тромбообразованию.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестное.

Особенности применения

С осторожностью применять больным с желудочно-пищеводным рефлюксом, изжогой.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано.

Способ применения и дозы

2 десертные ложки сбора поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 3 раза в сутки за 30 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет – по 1/2-1/3 стакана, детям в возрасте 12-14 лет – по 1/4 стакана, 7-12 лет – по 2 столовые ложки, 3-7 лет – по 1 столовой ложке. Перед применением настой взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде 3 раза в сутки за 30 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет – по 1/2-1/3 стакана, детям в возрасте 12-14 лет – по 1/4 стакана, 7-12 лет – по 2 столовые ложки, 3-7 лет – по 1 столовой ложке.

Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат применять детям в возрасте от 12 лет.

Передозировка

Возможно головокружение, тошнота, повышение артериального давления, боли в области сердца.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, крапивница, контактный дерматит). При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

2 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 ° С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г в пачке с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Лектравы», Украина.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., Г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.