

Состав

действующее вещество: чистотела трава (*Chelidonii herba*);

1 пачка содержит чистотела травы (*Chelidonii herba*) 50 г.

Лекарственная форма

Трава.

Основные физико-химические свойства: кусочки листьев, стеблей, цветков и плодов разной формы. Цвет светло-зеленый, зеленый, голубовато-зеленый, сизоватый с ярко-желтыми, желтыми, буроватыми, зеленовато-коричневыми, бурыми или черными вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм. Код АТХ А16А Х.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества травы чистотела оказывают желчегонное, спазмолитическое, болеутоляющее, седативное, бактерицидное, мочегонное действие.

Показания

В комплексном лечении заболеваний печени и желчного пузыря (гепатитов, холангит, холецистит) и заболеваний кожи (импетиго, псориаза, дерматитов, экзем).

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Эпилепсия, бронхиальная астма, стенокардия, органические изменения печени или почек, неврологические синдромы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Особенности применения

Прием препаратов чистотела допустим только по назначению врача и под его наблюдением.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Может влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами, учитывая способность препаратов чистотела подавлять центральную нервную систему.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано.

Способ применения и дозы

1 чайную ложку травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде по $\frac{1}{4}$ стакана 2 раза в сутки за 15 мин до еды. Курс лечения – 2-3 недели.

1 фильтр-пакет поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15-20 мин. Принимать настой в теплом виде по $\frac{1}{4}$ стакана 2 раза в сутки за 15 мин до еды. Курс лечения – 2-3 недели.

При заболеваниях кожи внутреннее применение настоя сочетают с наружным в виде примочек.

Дети

Противопоказано.

Передозировка

В результате длительного внутреннего применения препарата и в случае превышения рекомендованных доз возможно головокружение, отравления с тошнотой и рвотой, болью в желудке в тяжелых случаях может развиваться паралич дыхательного центра. При возникновении подобных симптомов следует прекратить прием препарата, терапия симптоматическая.

Побочные реакции

При гиперчувствительности возможны аллергические реакции (в том числе гиперемия, зуд и высыпания на коже), тошнота, рвота, в тяжелых случаях - паралич дыхательного центра. При появлении побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 ° С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г в пачке с внутренним пакетом.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ЧАО «Лектравы», Украина.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., Г. Житомир, шоссе Киевское, д. 21.