

Состав

действующее вещество: спорыша трава (Polygoni avicularis herba);

1 пачка содержит спорыша травы (Polygoni avicularis herba) 100 г.

Лекарственная форма

Трава резано-прессованная.

Основные физико-химические свойства: кусочки цилиндрической формы, диаметром от 4 до 6 мм, длиной 8-12 мм. Поверхность гладкая, блестящая, изредка матовая, мраморная, на торцах неровная. Цвет коричневато-зеленый со светло-желтыми вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в урологии. Код АТХ G04В С.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества травы предотвращают образование и способствуют выведению мочевых конкрементов при мочекаменной болезни, усиливают диурез, выводят с мочой избыток ионов натрия и хлора, увеличивают фильтрацию в почечных клубочках и уменьшают обратную резорбцию в почечных канальцах, уменьшают проницаемость стенок кровеносных сосудов.

Показания

Начальные стадии мочекаменной болезни; мочекислый диатез послеоперационный период после удаления мочевых конкрементов; хроническая почечная недостаточность хронический гломерулонефрит, пиелонефрит, воспаление мочевого пузыря в стадии ремиссии (в составе комплексной терапии).

Противопоказания

тромбофлебит; острые воспалительные заболевания почек и мочевого пузыря; изменение реологических свойств крови наличие в мочевыводящих путях камней размером более 6 мм. Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестное.

Особенности применения

Рекомендуется принимать настой через соломинку, чтобы предотвратить попадание его на зубы (возможно растворение эмали и повреждения зубов).

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано.

Способ применения и дозы

1 столовую ложку травы резаные-прессованной поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Перед применением настой взболтать. Принимать в теплом виде 2-3 раза в день за 15-20 мин до еды: взрослым - по $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ стакана, детям старше 14 лет - по $\frac{1}{4}$ стакана, детям 12-14 лет - по 2 столовые ложки, 7-12 лет - по 1 столовой ложке.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 ° С не более 2 суток.

Курс лечения - до 20-25 дней. Повторные курсы (не более 4-х раз в год) проводить после 10-12 дневного перерыва.

Дети

Препарат применять детям в возрасте от 7 лет.

Передозировка

Сообщение отсутствуют.

Побочные реакции

Аллергические реакции (в т.ч. кожная сыпь, зуд, гиперемия, отек кожи), почечная колика. Длительное применение препарата может привести к дискорилизации зубной эмали и нарушения структуры костной ткани (остеопороза).

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 ° С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 г в пачке с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Лектравы», Украина.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., Г. Житомир, шоссе Киевское, д. 21.