

Состав

действующее вещество: эвкалипта прутовидного листа (Eucalypti viminalis folia);

1 пачка содержит эвкалипта прутовидного листа (Eucalypti viminalis folia) 75 г.

Лекарственная форма

Листьев.

Основные физико-химические свойства: кусочки листьев различной формы с примесью бутонов, плодов, кусочков веточек, от светло-зеленого до серовато-зеленого, иногда с фиолетовым оттенком и слабым сизоватым налетом с ароматным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для применения в стоматологии. Код АТХ А01А D11.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества препарата оказывают антисептическое, противовоспалительное, болеутоляющее, вяжущее, репаративное и отхаркивающее действие; проявляют бактерицидное и бактериостатическое действие на стрептококки, стафилококки, дизентерийную и кишечную палочки, гнойные и анаэробные микроорганизмы; способствуют быстрому заживлению ран.

Показания

Заболевания полости рта и верхних дыхательных путей (стоматиты, гингивиты, ларингиты, фарингиты, трахеиты), свежие и инфицированные раны, воспалительные заболевания женских половых органов.

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.
Бронхиальная астма, бронхоспазм, коклюш, ложный круп.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

По назначению врача в том случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода / ребенка.

Способ применения и дозы

2 столовые ложки листьев поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре в течение 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Перед применением настой взболтать. Наружно применять для ингаляций и полосканий 3-4 раза в сутки: взрослым и детям старше 12 лет – 1 столовую ложку настоя развести в 200 мл кипяченой воды; детям в возрасте 7-12 лет – 1 десертную ложку настоя развести в 200 мл кипяченой воды, 3-7 лет – 1 чайную ложку настоя развести в 200 мл кипяченой воды.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Наружно применять для ингаляций и полосканий 3-4 раза в сутки: взрослым и детям старше 12 лет – 2 столовые ложки настоя развести в 200 мл кипяченой воды; детям в возрасте 7-12 лет – 1 столовую ложку настоя развести в 200 мл кипяченой воды, 3-7 лет – 1 десертную ложку настоя развести в 200 мл кипяченой воды.

В гинекологической и хирургической практике применять в виде примочек, промываний и спринцеваний.

Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат применять детям в возрасте от 3 лет.

Передозировка

При длительном и частом ингаляционном применении возможно сухость слизистых оболочек органов дыхания.

Побочные реакции

Аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, крапивница, контактный дерматит). При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата.

Срок годности

2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 75 г в пачке с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., Г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.