

Состав

Натрий гиалуронат 0,15%, карбоксиметил бета-глюкан, витамин А пальмитат, витамин Е TPGS, SCO® в буферизированном изотоническом растворе pH 7,0.

Описание

Капли НАВИТЕ ПЛЮС содержат полисахаридные увлажняющие вещества, такие как гиалуронат натрия и карбоксиметил бета-глюкан, и защитную увлажняющую липофильную систему, состоящую из витамина А и пегилированного витамина Е.

Местное применение глазного витамина А облегчает ношение контактных линз за счет уменьшения фрикционных механических повреждений, которые они могут нанести эпителиальным клеткам роговицы и конъюнктивы. Витамин А стабилизирует жировую фазу слезной пленки, увеличивая ее способность поддерживать естественную гидратацию, тем самым уменьшая симптомы сухости глаз. Такой эффект осуществляют также полисахариды, присутствующие в продукте.

Витамин Е является антиоксидантом, который помогает снизить концентрацию свободных радикалов в слезной жидкости, а следовательно, усиливает защиту клеток эпителия роговицы и конъюнктивы, снижая риск воспаления.

Капли НАВИТЕ ПЛЮС законсервированы с помощью специальной системы консервации под названием SCO® (Стабилизированный комплексный оксихлор), который сохраняет раствор стерильным во флаконе. Под действием света SCO® разлагается на компоненты, естественно содержащиеся в слезах человека, такие как хлорид натрия, кислород и вода, благодаря чему он очень хорошо переносится.

Показания

Капли НАВИТЕ ПЛЮС - увлажняющий офтальмологический раствор с антиоксидантным и увлажняющим действием, используется для уменьшения чувства сухости и дискомфорта глаз, причинами которых является:

- раздражение глаз, вызванное такими патологиями, как кератит, неблагоприятные
- последствия после хирургических операций на роговице, травматические язвы, воспаления роговицы;
- окислительный стресс в результате воздействия света и/или увеличение свободных радикалов на глазной поверхности;

- ношение контактных линз.

Капли НАВИТЕ ПЛЮС совместимы со всеми типами контактных линз.

Предостережение

- Чтобы предотвратить возможное загрязнение, не допускайте контакта кончика капельницы с любой поверхностью или глазом.
- Не используйте в случае специфической гиперчувствительности к компонентам раствора.
- В некоторых случаях сразу после закапывания возможно незначительное ощущение легкого покалывания или раздражение, которое исчезает с миганием.
- Если раздражение глаз сохраняется, и вы чувствуете боль, покраснение или изменение зрения после инстилляций, проконсультируйтесь со своим специалистом.
- Держать в недоступном для детей месте.
- Не использовать после истечения срока годности.
- После открытия флакона раствор необходимо использовать в течение 90 дней.
- Не использовать, если флакон поврежден.
- Беречь от прямых солнечных лучей.

Способ применения и дозы

- Тщательно вымойте, промойте и высушите руки.
- Убедитесь, что пломба не повреждена.
- Чтобы открыть флакон, полностью открутите верх и сломайте защитную пломбу.
- Закапывайте по 1 или 2 капли в каждый глаз по необходимости или по рекомендации специалиста.
- После использования флакон плотно закройте.

Условия хранения

Хранить в условиях температуры от 5 до 35 °С и защищать от прямых источников света.

Упаковка

По 15 мл в флаконе; по 1 флакону в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Novax Pharma SARL, Монако.