

Состав

действующее вещество: декспантенол;

1 г мази содержит декспантенола 50 мг;

вспомогательные вещества: глицерин (85%), парафин белый мягкий, ланолин, масло минеральное легкое, парафин, спирт стеариловый, спирт цетиловый, вода очищенная.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: гомогенная мазь бледно-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, которые способствуют заживлению (рубцеванию) ран. Код АТХ D03A X03.

Фармакодинамика

Декспантенол, действующее вещество мази пантенол, который в клетках быстро превращается в пантотеновую кислоту и действует как витамин. Декспантенол легче, чем пантотеновая кислота, абсорбируется после местного применения.

Пантотеновая кислота является компонентом коэнзима А (CoA), который играет центральную роль в метаболизме каждой клетки. Пантотеновая кислота, таким образом, необходимая для восстановления и регенерации поврежденных кожи и слизистых оболочек.

Фармакокинетика

Декспантенол быстро абсорбируется кожей, после чего сразу превращается в пантотеновую кислоту и добавляется к внутреннему депо витамина.

В крови пантотеновая кислота связывается с белками плазмы крови (преимущественно с β -глобулинами и альбумином). У здоровых взрослых пациентов концентрация составляет примерно 500-1000 мкг/л и 100 мкг/л в

крови и сыворотке крови соответственно.

Пантотеновая кислота не метаболизируется в организме и выводится в неизмененном виде. У взрослых выделяется с мочой 2-7 мг пантотеновой кислоты в сутки, у детей - 2-3 мг.

Показания

Пантенол, мазь, применять в следующих случаях:

- для ускорения заживления и эпителизации кожи при микроповреждениях (нетяжкие ожоги и ссадины), при раздражениях кожи (например вследствие радиотерапии, фототерапии или облучения ультрафиолетовыми лучами), при хронических язвах кожи и пролежней;
- при анальных трещинах;
- при эрозии шейки матки и после пересадки кожи;
- для профилактики и лечения трещин кожи или шероховатости и сухости кожи;
- для регулярного профилактического ухода за молочными железами у женщин, кормящих грудью, и для лечения раздражений и трещин сосков;
- для ухода за младенцами: профилактика и лечение пеленочного дерматита;
- для обработки кожи пациентов во время и после местного применения кортикостероидов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к декспантенолу или другим компонентам препарата.

Декспантенол противопоказан для применения на раны пациентов с гемофилией в связи с высоким риском кровотечения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Декспантенол может усиливать действие деполяризующих миорелаксантов (суксаметония хлорида, декаметония бромид) и ослаблять действие недеполяризующих миорелаксантов благодаря способности стимулировать синтез ацетилхолина.

Особенности применения

При применении препарата следует избегать контакта с глазами.

Мазь нельзя наносить на мокнущие раны.

Ланолин, спирт стеариловый, спирт цетиловый могут вызывать местные кожные реакции (например контактный дерматит).

При применении мази в области половых органов и заднего прохода и одновременном использовании презерватива может уменьшиться его прочность и, следовательно, эффективность применения последнего.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Нет никаких оснований считать, что применение препарата наружно в период беременности и кормления грудью является рискованным. В течение беременности препарат следует применять по назначению врача.

При применении для лечения трещин сосков перед кормлением ребенка необходимо снять остатки мази с помощью салфетки, промыть сосок и кожу вокруг теплой кипяченой водой.

Способ применения и дозы

Лечение поверхностных ран любого происхождения и профилактика трещин кожи, сухости или шероховатости кожи: применять Пантенол, мазь, 1 или несколько раз в сутки в зависимости от потребности.

Уход за молочными железами у женщин, кормящих грудью: наносить мазь на соски после каждого кормления грудью.

Лечение дефектов слизистой оболочки шейки матки применять мазь 1 или несколько раз в сутки под наблюдением врача.

Уход за младенцами: применять Пантенол, мазь, после каждой смены пеленок (подгузника).

Дети

Препарат можно применять детям разных возрастных групп, включая младенцев.

Передозировка

Действующее вещество лекарственного средства декспантенол нетоксично. Гипервитаминоз не описан.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы, а также кожи и подкожных тканей.

Сообщалось об аллергических реакциях, включая реакции со стороны кожи: контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, эритема, экзема, сыпь, крапивница, раздражение кожи и пузырьки.

В случае возникновения каких-либо побочных реакций необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° C в недоступном для детей месте.

После первого вскрытия препарат хранить в закрытой тубе при температуре не выше 25 ° C и использовать в течение 3 месяцев.

Упаковка

По 30 г в тубе; по 1 тубе в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

«Хемофарм» АД.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Белградский путь б/н, 26300, г. Вршац, Республика Сербия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).