

Склад

діючі речовини: 1 таблетка містить: Aconitum napellus D6 – 60 мг, Agaricus D4 – 15 мг, Ammonium bromatum D4 – 30 мг, Atropinum sulfuricum D6 – 30 мг, Citrullus colocynthis D4 – 30 мг, Cuprum sulfuricum D6 – 15 мг, Gelsemium sempervirens D6 – 30 мг, Magnesium phosphoricum D6 – 30 мг, Matricaria recutita D3 – 15 мг, Passiflora incarnata D2 – 15 мг, Veratrum album D6 – 30 мг;

допоміжні речовини: магнію стеарат; лактоза моногідрат.

Лікарська форма

Таблетки.

Основні фізико-хімічні властивості: круглі плоскі таблетки з фаскою, від білого до жовто-білого кольору, можливі жовто-коричневі вкраплення, без запаху.

Фармакотерапевтична група

Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості

Фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості для гомеопатичних препаратів не визначаються.

Показання

Спазми гладкої мускулатури органів (шлунок, кишечник, жовчний міхур, матка, сечовивідні шляхи); спастичність поперечно-смугастої мускулатури (міогельоз, затвердіння м'язів).

Протипоказання

Вагітність. Період годування груддю. Підвищена чутливість до ромашки лікарської або до будь-якого компонента лікарського засобу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Невідома.

У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

Особливості щодо застосування

Препарат містить лактозу, тому його не можна застосовувати пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції.

Якщо пацієнт має постійні скарги, пов'язані з жовчнокам'яною хворобою, обтурацією жовчовивідних шляхів, або жовтяницею, необхідно проконсультуватися з лікарем.

На початку лікування препаратом можливе короточасне загострення наявних симптомів захворювання (первинна реакція). Така реакція є тимчасовою. Якщо симптоми не зникають і спостерігається погіршення стану, застосування лікарського засобу слід припинити та звернутися до лікаря за консультацією.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Не застосовують.

Спосіб застосування та дози

Разова доза: дорослим та дітям віком від 12 років – 1 таблетка під язик (до повного розсмоктування). Приймати 3 рази на добу за 15–20 хвилин до вживання їжі або через 1 годину після їди.

У разі гострого початку захворювання приймати 1 таблетку кожні 15 хвилин протягом перших 2 годин, далі з наступного дня – по 1 таблетці 3 рази на добу.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально. Якщо симптоми зберігаються протягом 1 тижня, необхідна консультація з лікарем.

Діти

Лікарський засіб рекомендований для застосування дітям віком від 12 років.

Побічні ефекти

У поодиноких випадках можуть виникати алергічні шкірні реакції.

У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід проконсультуватися з лікарем.

Термін придатності

5 років.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня вказаного місяця.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Закривати контейнер із таблетками негайно після застосування, захищати від вологи.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

50 таблеток у поліпропіленовому контейнері, в картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ /

Biologische Heilmittel Heel GmbH.