

Состав

действующее вещество: сульфаниламид;

1 г мази содержит сульфаниламиды 50 мг (0,05 г);

вспомогательные вещества: парафин белый мягкий.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства:

мазь 5%: мазь белого или светло-желтого цвета. По внешнему виду должно быть однородной.

Фармакотерапевтическая группа

Сульфаниламиды. Код АТХ D06B A05.

Фармакодинамика

Лекарственное средство оказывает антимикробное влияние на стрептококки и другие микроорганизмы. Стрептоцид нарушает процесс ассимиляции микробной клеткой факторов ее роста - фолиевой кислоты и аналогичных веществ, которые имеют в своем составе ПАБК (ПАБК), то есть в результате сходства структуры ПАБК и сульфаниламидов последний является конкурентным антагонистом кислоты на уровне биохимических систем микроорганизмов.

Фармакокинетика

Фармакокинетика не определялась.

Показания

Язвы, ожоги, трещины, раны, пиодермии, рожа кожи, гнойно-воспалительные процессы кожи, не сопровождающихся выраженной экссудацией.

Противопоказания

Лекарственный препарат противопоказан при повышенной чувствительности к компонентам лекарственного средства или в любых других сульфаниламидных

средств, при почечной недостаточности, острой порфирии, а также в период беременности и кормления грудью.

Особые меры безопасности

При появлении аллергической реакции в месте нанесения мази следует прекратить применение препарата. Преждевременное прекращение лечения лекарственным средством может вызвать развитие устойчивых к сульфаниламидам микроорганизмов.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При применении «Стрептоцидовая мази» нежелательно принимать такие лекарственные средства, как дигитоксин, соляная кислота, кофеин, мезатон, фенobarбитал, адреналина гидрохлорид.

Новокаин, который содержит остаток парааминобензойной кислоты, снижает эффективность лекарственного средства, если эти лекарственные средства применять сразу друг за другом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано применение лекарственного средства.

Способ применения и дозы

«Стрептоцидовую мазь» наносить тонким слоем на пораженный участок, в том числе под марлевую повязку. Кратность и длительность применения определяется врачом и зависит от тяжести заболевания и достигнутого терапевтического эффекта.

Дети

Безопасность и эффективность применения «Стрептоцидовая мази» детям не установлены, поэтому применять препарат детям не рекомендуется.

Передозировка

Возможно усиление проявлений побочных реакций.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции, включая дерматит, крапивница, развитие которых требует немедленной отмены препарата.

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С; не допускается замораживание. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 г в тубе.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 69063, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).