Состав

действующее вещество: настойка шалфея листья;
1 флакон содержит настойки шалфея листья (Salviae folia) (1: 5) (экстрагент - этанол 70%) 40 мл.

Лекарственная форма

Настойка.
Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость зеленовато-бурого цвета, со специфическим ароматным запахом при хранении допускается образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, способствующие заживлению (рубцеванию) ран и язв. Код АТХ D03A X.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества шалфея листья (эфирное масло, дубильные вещества, сапонины, фитонциды, смолы) оказывают противомикробное, противовоспалительное, вяжущее, дезинфицирующее действие.

Показания

1. Воспалительные заболевания слизистых оболочек полости рта, десен (стоматит, гингивит, пародонтоз), глотки, миндалин (фарингит, тонзиллит), верхних дыхательных путей.
2. Инфицированные раны, порезы, ожоги кожи.

Противопоказания

Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Шалфея настойка усиливает действие других противовоспалительных средств.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

По назначению врача в том случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способ применения и дозы

Перед применением взболтать.
Для полоскания полости рта применять в виде свежеприготовленного раствора: 1 чайную ложку шалфея настойки развести в стакане теплой кипяченой воды.
Для местных аппликаций развести 20-60 капель настойки в 100 мл изотонического раствора натрия хлорида.
Продолжительность курса лечения зависит от характера заболевания, достигнутого лечебного эффекта и составляет 7-14 суток.

Дети

Клинический опыт применения препарата у детей в возрасте до 12 лет отсутствует.

Передозировка

Сообщения отсутствуют.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции (в т. ч. покраснение и отек кожи, сыпь, зуд).

Срок годности

3 года.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° в защищенном от света и недоступном для детей месте.

Упаковка

По 40 мл во флаконе в пачке или по 40 мл во флаконах,.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ГКП« Фармацевтическая фабрика ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — Государственного реестра лекарственных средств Украины.