

## **Состав**

*действующее вещество:* эфир поливинилбутиловый.

1 г Винилина® (Бальзама Шостаковского) содержит 1 г эфира поливинилбутилового.

## **Лекарственная форма**

Жидкость накожная.

*Основные физико-химические свойства:* густая, вязкая жидкость от светло-желтого до коричневатого-желтого цвета со специфическим запахом. На воздухе не густеет и не высыхает. Легко растворяется в пропаноле и толуоле, практически не растворяется в воде и спирте этиловом 96 %. Смешивается во всех соотношениях с этиловым эфиром, хлороформом, маслами и жидким парафином.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средство для лечения ран и язвенных поражений.

Код АТХ D03A X.

## **Фармакодинамика**

Винилин® (Бальзам Шостаковского) обладает противомикробным действием, способствует очищению ран, регенерации и эпителизации тканей.

## **Фармакокинетика**

Антисептическое действие обусловлено способностью препарата дегидратировать микробные клетки, вызывая коагуляцию белка и гибель микробных клеток. В результате восстановления происходит замещение очагов некроза специфической и/или соединительной (имеет самый высокий потенциал регенерации) тканью.

## **Показания**

При фурункулах, карбункулах, трофических язвах, гнойных ранах, ранениях мягких тканей, ожогах, обморожениях, дерматитах и воспалительных заболеваниях кожи.

## **Противопоказания**

Индивидуальная повышенная чувствительность организма к лекарственному средству.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не описано.

## **Особенности применения**

Можно применять в виде 20 % масляного раствора, в том числе в сочетании с другими совместимыми с Винилином® лекарственными средствами (мазями на вазелиновой и других основах, пастами и кремами).

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Отсутствуют данные об отрицательном влиянии лекарственного средства на способность управлять автотранспортом и обслуживать движущиеся механические приспособления.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Информация о применении препарата в период беременности и кормления грудью отсутствует, применение препарата не рекомендуется.

## **Способ применения и дозы**

Применять для смачивания салфеток и непосредственного нанесения на пораженную поверхность, в чистом виде или в виде 20 % раствора в персиковом либо других растительных маслах, а также в мазях. Частота применения – 3–5 раз в сутки.

Курс лечения определяется врачом индивидуально.

## **Дети**

Информация о применении препарата детям отсутствует, применение препарата не рекомендуется.

## **Передозировка**

Симптомы передозировки не описаны.

### **Побочные реакции**

Очень редко - индивидуальная повышенная чувствительность к препарату: возможны аллергические реакции, в основном местного характера.

### **Срок годности**

5 лет.

### **Условия хранения**

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 50 г в банках.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

АО «ВИТАМИНЫ».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 20300, Черкасская обл., г. Умань, ул. Успенская, 31.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).